



RAPPORT

2025

Nye kræfttilfælde i Danmark 2024

Cancerregisteret



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1,0
Versionsdato	25. juni 2025
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Nye kræfttilfælde i Danmark 2024

Publikationen "Nye Kræfttilfælde i Danmark" fra Sundhedsdatastyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Rapporten kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Nye kræfttilfælde i 2024	4
1.1	48.458 nye kræfttilfælde i 2024	4
2.	Udvikling i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper	7
2.1	Hoved- og halskræft	8
2.2	Tyk- og endetarmskræft	9
2.3	Kræft i lunge, bronkier og luftrør	10
2.4	Modermærkekræft i hud og anden hudkræft	11
2.5	Prostatakræft	12
2.6	Testikelkræft	13
2.7	Brystkræft	14
2.8	Livmoderhals-, livmoder og æggestokkræft	15
2.9	Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	16
2.10	Hjerne- og centralnervesystem	17
3.	Prævalens	18
3.1	Antal personer der lever med en kræftdiagnose i 2024	18
3.2	Udvikling i prævalensen 2015-2024	20
Bilag 1.	Efterregistreringer	21
Bilag 2.	Diagnosekoder for udvalgte grupper	23
Bilag 3.	Nye kræfttilfælde fordelt på udvalgte grupper	24
Bilag 4.	Nye kræfttilfælde fordelt på hovedgrupper efter ICD10	28
Bilag 5.	Nye kræfttilfælde og alder	32
Bilag 6.	Prævalens fordelt på køn og udvalgte grupper	34
Bilag 7.	Regionsfordeling	36
Bilag 8.	Primær lokalisation og køn	40

1. Nye kræfttilfælde i 2024

I denne rapport præsenteres tal fra Cancerregisteret for nye kræfttilfælde i 2024. Rapporten indeholder tal for udviklingen i antallet af nye tilfælde generelt og fordelt på udvalgte diagnosegrupper. Vær opmærksom på, at y-akserne i figur 1-11 er forskellige, da de aldersstandardiserede incidensrater varierer i niveau afhængigt af diagnosegruppe. Dette er gjort for bedre at kunne illustrere udviklingen over tid inden for hver diagnosegruppe. Ud over dette indeholder rapporten tal for prævalensen af kræft i den danske befolkning.

Derudover findes en række bilagstabeller, der viser mere detaljerede fordelinger på eksempelvis køn, aldersgrupper og region samt forskellige diagnosegrupperinger.

Det bemærkes, at tallene for 2020 skal ses i lyset af COVID-19 epidemien. Sundhedsvæsenet har været åbent under hele COVID-19 epidemien, hvorfor udredning og behandling af akut og livstruende sygdom, herunder kræft, har været fastholdt uændret under epidemien. Til trods herfor har det samlede antal henvisninger til kræftpakkeforløb samt befolkningens deltagelse i screeningstilbud i perioder været påvirket af epidemien. Læs mere om udviklingen i sundhedsvæsenets aktivitet under COVID-19 epidemien [her](#).

Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af tallene for nye kræfttilfælde 2024 er fremrykket to måneder i forhold til det foregående år. Der skal således tages forbehold ved sammenligning af incidens og incidensrater mellem 2024 og 2023, da det observerede fald i 2024 kan være påvirket af den kortere opgørelsesperiode.

Gennem det målrettede arbejde for at færdiggøre kvalitetssikringen af cancerregisteret har det været muligt at fremrykke publiceringen af den samlede rapport til gavn for hele sundhedsvæsenet. Det har medført, at Danmark placerer sig blandt de lande, der hurtigst offentliggør opdaterede og validerede opgørelser på cancerområdet for det foregående år.

Beskrivelse af kilder og metode er tilgængelig på eSundhed under fanen *Information* [her](#).

1.1 48.458 nye kræfttilfælde i 2024

I 2024 registreredes 48.458 nye kræfttilfælde, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct. i forhold til 2023 (48.518). I perioden 2015 til 2024 er det samlede antal nye kræfttilfælde steget fra 43.179 til 48.458, hvilket svarer til en stigning på ca. 12 pct. over ti år. Nærværende publikation er baseret på den opdaterede version af Cancerregisteret per maj 2025. Af Bilagstabel 1 fremgår ændringer i det samlede antal nye kræfttilfælde for årene 2015 til 2024 på baggrund af den seneste version af Cancerregisteret sammenholdt med tidligere versioner.

Faldet i antallet af nye kræfttilfælde afspejles også i den aldersstandardiserede incidensrate, som er faldet fra 650 i 2023 til 639 pr. 100.000 personer i 2024. I perioden 2015-2024 har den samlede rate for mænd og kvinder varieret mellem 633 og 659, hvilket indikerer en vis variation uden en klar tendens over årene, jf. Tabel 1.

Tabel 1 Nye kræfttilfælde* (incidens) samt incidensrate (pr. 100.000 personer, aldersstandardiseret**), 2015-2024


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Incidens (mænd og kvinder)	43 179	43 647	44 043	44 448	45 195	45 102	47 197	47 763	48 518	48 458
Incidensrate** (aldersstandardiseret, mænd og kvinder)	659	657	649	645	647	633	651	649	650	639

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.
**Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

I 2024 blev der diagnosticeret 24.794 nye kræfttilfælde blandt mænd og 23.664 blandt kvinder. Over de seneste 10 år er incidensraten faldet med 7 pct. blandt mænd, mens den har været relativt stabil blandt kvinder, jf. Figur 1. Mænd har dog fortsat en markant højere incidensrate end kvinder. I 2024 var den aldersstandardiserede incidensrate 680,6 for mænd og 609,8 for kvinder.

Figur 1 Aldersstandardiseret* incidensrate (pr. 100.000 personer) fordelt på køn, 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

Tekstboks 1: Aldersstandardiseret incidensrate

De fleste kræftsygdomme rammer i overvejende grad ældre personer. Derfor har udviklingen i befolkningens alderssammensætning indflydelse på det absolutte antal kræfttilfælde, hvilket kan vanskeliggøre sammenligning over tid. Der tages hensyn til ændringer i befolkningens alderssammensætning ved anvendelse af aldersstandardiserede incidensrater. I denne rapport angiver incidensrater antallet af nye kræfttilfælde pr. 100.000 mænd/kvinder aldersstandardiseret til den danske befolknings alderssammensætning i 2000 for at sikre sammenlignelige tal over tid.

2. Udvikling i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper

I dette afsnit præsenteres udviklingen i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper for perioden 2015-2024. De specifikke diagnosekoder anvendt i inddelingen af grupperne fremgår af Bilagstabel 2.

I de kommende afsnit gennemgås hver af de udvalgte grupper med figurer over udviklingen i aldersstandardiserede incidensrater de seneste ti år. Tal for antal nye tilfælde og incidensrater for mænd og kvinder findes i bilagstabellerne.

Tekstboks 2: Diagnostisk aktivitet

Øget opmærksomhed og diagnostisk aktivitet kan medføre en stigning i hyppigheden af diagnosticerede kræfttilfælde over tid. Pakkeforløb for kræftsygdomme, øget screening og anvendelse af flere diagnostiske tests har indflydelse på både antallet af diagnosticerede kræftsygdomme, og hvornår i sygdomsforløbet diagnosen stilles. Når screeningsprogrammer startes, vil der initialt observeres en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde, især i antal tilfælde diagnosticeret i sygdommens tidlige stadier. Da diagnosticeringen dermed er fremskyndet, vil antallet af fremskredne tilfælde falde i de efterfølgende år. En yderligere konsekvens af screening er, at der kan diagnosticeres tilfælde, der ikke nødvendigvis ville være blevet diagnosticeret før start af screenings-tilbuddet, hvilket også naturligt påvirker incidensen.

I Danmark blev screening mod livmoderhalskræft indført i en række kommuner og amter fra 1960'erne. Siden 2006 er alle danske kvinder i aldersgruppen 23-64 år blevet tilbudt screening for livmoderhalskræft. I årene frem til 2009 blev den diagnostiske aktivitet for prostatakræft og brystkræft øget med henblik på tidlig opsporing og diagnose. Det indebar øget brug af PSA-måling, men ikke officiel (national) screening, samt udrulning af mammografiscreening i 2007-2009 for alle kvinder i Danmark i aldersgruppen 50-69 år. I perioden 2014-2018 blev et nationalt screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft implementeret for kvinder og mænd i aldersgruppen 50-74 år. Tallene for nye tilfælde af prostata, bryst- og tyk- og endetarmskræft skal ses i lyset af disse initiativer.


2.1 Hoved- og halskræft

Gruppen *hoved- og halskræft* dækker over kræft i mundhule og svælg samt næsehule, mellemøre, bihuler, strubehoved og skjoldbruskkirtel (se Bilagstabel 2).

I 2024 blev der diagnosticeret 1.110 nye tilfælde af hoved- og halskræft hos mænd og 791 hos kvinder (se Bilagstabel 3 og 4).

Den aldersstandardiserede incidensrate for hoved- og halskræft blandt mænd har generelt været faldende de seneste år, men er steget fra 30,7 i 2023 til 31,3 i 2024 (se Bilagstabel 5). For kvinder har incidensraten generelt været let stigende gennem hele perioden, fra 19,3 i 2015 til 22,3 i 2024, selvom der ses et fald fra 24,1 i 2023 til 22,3 i 2024 (se Bilagstabel 6).

Figur 2 Aldersstandardiseret* incidensrate for hoved- og halskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.2 Tyk- og endetarmskræft

Den højere incidens af tyk- og endetarmskræft i perioden omkring 2015 og det efterfølgende udviklingsmønster i incidensraten skal ses i lyset af indførelsen af det nationale screeningsprogram i 2014, *jf.* Tekstboks 2, side 6.

For begge køn har der været en faldende tendens i incidensraten for tyktarmskræft siden 2015. For kvinder er raten faldet fra 52,3 i 2015 til 41,6 i 2024, mens den for mænd er faldet fra 63,6 i 2015 til 41,2 i 2024. Det seneste år er raten steget for kvinder, men faldet for mænd, hvilket har medført, at raterne i 2024 er tilnærmelsesvist ens for begge køn, *jf.* Figur 3. I 2024 blev der diagnosticeret 1.747 nye tilfælde af tyktarmskræft blandt kvinder, hvilket svarer til en stigning på 12 pct. sammenlignet med 2023 (se Bilagstabel 4). Blandt mænd blev der diagnosticeret 1.487 nye tilfælde svarende til et fald på 4 pct. (se Bilagstabel 3).

For kræft i endetarmen ses en let faldende incidensrate for begge køn i perioden 2015 til 2024. Raterne er generelt højere hos mænd end hos kvinder; for kvinder er raten faldet fra 20 i 2015 til 11,4 i 2024, mens den for mænd er faldet fra 34,6 i 2015 til 21,9 i 2024, *jf.* Figur 3.

Figur 3 Aldersstandardiseret* incidensrate for tyk- og endetarmskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


I 2014 indførtes nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft.

2.3 Kræft i lunge, bronkier og luftrør

I perioden 2015 til 2024 har udviklingen i den aldersstandardiserede incidensrate overordnet været faldende hos mænd, mens raten har været mere stationær hos kvinder i hele perioden, *jf.* Figur 4.

I 2024 diagnosticeredes 2.783 nye tilfælde blandt kvinder, mens der var 2.394 nye tilfælde blandt mænd. Den aldersstandardiserede incidensrate var i 2024 62,8 for mænd, hvilket er et fald sammenlignet med 67,0 i 2023 (se Bilagstabel 5). Blandt kvinder ses et mindre fald, fra 66,8 i 2023 til 65,9 i 2024 (se Bilagstabel 6).

Figur 4 Aldersstandardiseret* incidensrate for kræft i lunge, bronkier og luftrør (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.4 Modermærkekræft i hud og anden hudkræft

Incidensraten af modermærkekræft er stort set uændret for mænd, men faldet for kvinder fra 2023 til 2024, *jf.* Figur 5. Incidensraten for mænd i 2024 var 44,2 mod 44,3 i 2023. For kvinder var incidensraten 42,2 i 2024 mod 44,7 i 2023 (se Bilagstabel 5 og Bilagstabel 6). Antallet af nye tilfælde i 2024 var henholdsvis 1.536 blandt mænd og 1.497 blandt kvinder (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

I 2024 diagnosticeredes 3.119 nye tilfælde med anden hudkræft blandt mænd og 2.645 blandt kvinder (se Bilagstabel 3 og 4). Incidensraterne for anden hudkræft har generelt været stigende frem til 2023 for både mænd og kvinder, *jf.* Figur 5. Fra 2023 til 2024 er incidensraten for kvinder dog forblevet uændret på 59,9, mens den for mænd er faldet fra 86,9 i 2023 til 85,0 i 2024 (se Bilagstabel 5 og 6). Den markante stigning fra 2019 til 2020 skyldes, at der i 2020 blev tilføjet en diagnosekode (keratoakantom) til gruppen 'Anden hudkræft'¹.

Figur 5 Aldersstandardiseret* incidensrate for henholdsvis modermærkekræft og anden hudkræft** (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

** Ekskl. basalcelle hudkræft.


¹ Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i gruppen af maligne incidente tilfælde. Ændringen resulterede i en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

2.5 Prostatakræft

Den aldersstandardiserede incidensrate for prostatakræft har overordnet været faldende i perioden 2015-2024, idet raten blandt mænd er faldet fra 142,3 i 2015 til 116,8 i 2024 (jf. Figur 6 og Bilagstabel 5).

Selvom antallet af nye tilfælde af prostatakræft er steget fra 4.412 i 2023 til 4.446 i 2024 (se Bilagstabel 3), har incidensraten været svagt faldende fra 117,5 i 2023 til 116,8 i 2024. Set i forhold til hele perioden (2015-2024) er raten således på sit laveste i 2024 (se Bilagstabel 5).

Figur 6 Aldersstandardiseret* incidensrate for prostatakræft (pr. 100.000 mænd), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.6 Testikelkræft

Den aldersstandardiserede incidensrate for testikelkræft har de seneste 10 år ligget mellem 10,0 og 13,1 nye tilfælde pr. 100.000 mænd årligt, *jf.* Figur 7. I 2024 blev der registreret 279 nye tilfælde, hvilket er det laveste antal i hele perioden (se Bilagstabel 3). Dette kommer ligeledes til udtryk i incidensraten, som det seneste år er faldet fra 12,2 i 2023 til 10,0 i 2024 (se Bilagstabel 5).

Testikelkræft adskiller sig fra andre kræftsygdomme ved, at langt størstedelen af tilfældene diagnosticeres blandt yngre mænd. I 2024 blev cirka 75 pct. af alle nye tilfælde diagnosticeret hos mænd under 45 år, heraf 90 tilfælde i aldersgruppen 15-29 år og 118 tilfælde i aldersgruppen 30-44 år, af i alt 279 tilfælde (se Bilagstabel 11).

Figur 7 Aldersstandardiseret* incidensrate for testikelkræft (pr. 100.000 mænd), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.7 Brystkræft

Incidensraten for brystkræft har ligget på et stabilt niveau mellem 145 og 150 i perioden fra 2015 til 2019. I 2020 faldt raten til 139,8, men er siden steget til 149 i 2024, *jf.* Figur 8.

Antallet af nye årlige brystkræfttilfælde har stort set også ligget på et stabilt niveau de seneste 10 år (mellem 4.827 og 5.415). I 2024 var antallet af nye tilfælde 5.389, hvilket er en smule færre end i 2023, hvor antallet var 5.415 (se Bilagstabel 4).

Figur 8 Aldersstandardiseret* incidensrate for brystkræft (pr. 100.000 kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.8 Livmoderhals-, livmoder og æggestokkræft

Incidensraten er i perioden 2015–2024 faldet for både livmoder- og livmoderhalskræft: for livmoderkræft fra 24,2 til 19,6 og for livmoderhalskræft fra 12,6 til 11,1 (se Figur 9 og Bilagstabel 6). Trods dette fald er raten for livmoderhalskræft samlet set steget siden 2021, hvor den var særlig lav med 9,6 nye tilfælde pr. 100.000 kvinder (se Bilagstabel 6). Antallet af nye tilfælde af livmoderkræft er faldet fra 837 nye tilfælde i 2023 til 769 i 2024, mens antallet af nye tilfælde af livmoderhalskræft er faldet fra 336 i 2023 til 326 i 2024 (se Bilagstabel 4).

Generelt skal udviklingen og det overordnede fald i incidensraten fra 2015-2024 ses i lyset af en faldende incidens i særligt de yngre aldersgrupper med en høj prævalens af HPV-vaccination.

Antallet af nye tilfælde af æggestokkræft² er faldet fra 552 i 2023 til 491 i 2024 (se Bilagstabel 4). Den højeste incidensrate blev observeret i 2020, efterfulgt af et fald i 2021. Siden da har raten ligget stabilt omkring 14 frem til 2023 og er i 2024 faldet til 12,9 (se Bilagstabel 6).

Figur 9 Aldersstandardiseret* incidensrate for livmoderhals-, livmoder- og æggestokkræft (pr. 100.000 kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


² Kræft i æggestokkene inkluderer også kræft i æggeledere og nærliggende bindevæv (se Bilagstabel 2).

2.9 Kræft i urinveje inkl. nyrekræft

Kræft i urinvejene inkl. nyrekræft omfatter kræft i nyre, nyrebækken, urinleder og urinblære samt "urothelial carcinoma in situ" og andre ikke-invasive tumorer i de fraførende urinveje (se Bilagstabel 2). Denne gruppe af kræftsygdomme diagnosticeres hyppigere blandt mænd end blandt kvinder, hvilket er illustreret i Figur 10, hvor mænd gennem hele perioden har en markant højere incidensrate end kvinder.

Over de seneste 10 år har den aldersstandardiserede incidensrate for kræft i urinvejene været nogenlunde stabil for begge køn, men med et let fald fra 79,5 til 74,6 for mænd og fra 29,4 til 25,4 for kvinder i perioden 2015 til 2024 (jf. Figur 10 og Bilagstabel 5 og 6). I 2024 blev der registreret 2.740 nye tilfælde blandt mænd og 1.059 blandt kvinder (se Bilagstabel 3 og 4).

Figur 10 Aldersstandardiseret* incidensrate for kræft i urinveje inkl. nyrekræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.10 Hjerne- og centralnervesystem

Gruppen svulster i *hjerne- og centralnervesystem* omfatter såvel kræft som andre svulster (godartede neoplasier) (se Bilagstabel 2).

Generelt diagnosticeres flere nye tilfælde af svulster i hjerne- og centralnervesystem blandt kvinder end blandt mænd. I 2024 blev der diagnosticeret 1.417 nye tilfælde blandt kvinder og 1.021 nye tilfælde blandt mænd (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

De aldersstandardiserede rater for svulster i hjerne- og centralnervesystemet varierer i perioden 2015-2024. For kvinder ses en stigende tendens raterne, mens raten for mænd i 2024 er tilbage på omtrent samme niveau som i 2015, *jf.* Figur 11. Den højeste incidensrate for begge køn blev observeret i 2019, efterfulgt af et fald i 2020 til et niveau svarende til 2018. Fra 2021 steg raten frem til 2023, men er siden faldet igen – for mænd fra 32,3 i 2023 til 30,8 i 2024, og for kvinder fra 41,8 til 41,5 i samme periode (se Bilagstabel 5 og 6).

Figur 11 Aldersstandardiseret* incidensrate for kræft i hjerne- og centralnervesystem (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

3. Prævalens

3.1 Antal personer der lever med en kræftdiagnose i 2024

Ved udgangen af 2024 var der 407.888 personer, henholdsvis 222.881 kvinder og 185.007 mænd i Danmark, som levede med kræft eller som tidligere havde fået en kræftdiagnose (prævalente tilfælde). En person kan være registreret med flere anmeldelsespligtige kræftsygdomme i flere af de udvalgte diagnosegrupper. Hvis personen har flere anmeldelsespligtige kræftsygdomme inden for *samme diagnosegruppe*, tæller kun den først diagnosticerede sygdom med i opgørelsen af prævalensen.

Tabel 2 viser prævalente tilfælde i Danmark for mænd, fordelt på udvalgte grupper og alder. Den største gruppe i 2024 udgøres af mænd med prostatakraft (51.048 tilfælde).

Tabel 2 Prævalens hos mænd fordelt på udvalgte grupper og alder, ultimo 2024*

Mænd	0-14 år	15-29 år	30-44 år	45-59 år	60-74 år	75+ år	Alle
Hoved- og hals	6	81	353	1 754	4 524	3 075	9 793
Tyktarm	6	67	228	1 087	4 417	8 140	13 945
Endetarm	0	6	116	817	3 290	4 510	8 739
Lunge, bronkier og luftrør	0	5	55	482	3 081	3 585	7 211
Modermærkekraft i hud	1-4	88	1 011	3 985	6 267	7 228	18 585
Anden hudkraft**	1-4	19	122	914	4 673	15 032	20 760
Prostata	0	0	12	1 637	19 024	30 375	51 048
Testikel	11	427	2 093	3 711	2 976	823	10 041
Kraft i urinveje inkl. nyrekraft	46	92	408	2 292	8 919	12 554	24 311
Hjerne- og central-nervesystem	162	616	1 320	2 574	3 513	2 815	11 000
Anden kraft	437	1 183	2 092	5 551	13 156	13 880	36 299
Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)	675	2 565	7 682	23 822	66 324	83 938	185 007

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025 og CPR pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *For de udvalgte grupper er angivet antal prævalente tilfælde, mens sidste linje i tabellen angiver antal unikke prævalente personer. Tallene for de udvalgte grupper summerer derfor ikke nødvendigvis til "Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)".

**Ekskl. basalcelle hudkraft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker, hvor det er muligt at udlede det diskretionerede tal.

Tabel 3 viser prævalente tilfælde i Danmark for kvinder, fordelt på udvalgte grupper og alder. Den største gruppe i 2024 udgøres af kvinder med brystkraft (80.963 tilfælde).

Tabel 3 Prævalens hos kvinder fordelt på udvalgte grupper og alder, ultimo 2024*

Kvinder	0-14 år	15-29 år	30-44 år	45-59 år	60-74 år	75+ år	Alle
Hoved og hals	5	188	868	2 292	3 398	2 401	9 152
Tyktarm	1-4	98	250	1 155	4 452	9 555	15 515
Endetarm	0	1-4	93	634	2 178	3 290	6 198
Lunge, bronkier og luftrør	0	14	92	832	4 658	4 807	10 403
Modermærkekræft i hud	1-4	198	2 334	6 860	7 753	8 007	25 155
Anden hudkræft**	5	37	140	1 278	4 548	12 652	18 660
Bryst	0	51	2 183	14 083	30 867	33 779	80 963
Livmoderhals	0	28	1 187	2 771	2 857	2 048	8 891
Livmoder	0	6	102	1 059	4 205	6 663	12 035
Æggestok	1-4	64	215	837	1 960	1 990	5 070
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	34	67	173	934	3 483	5 195	9 886
Hjerne- og central-nervesystem	136	755	1 769	3 973	5 104	4 816	16 553
Anden kræft	329	951	1 759	4 660	10 705	12 812	31 216
Kvinder i live (med tidligere kræftdiagnose)	515	2 440	10 929	39 363	77 940	91 694	222 881

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025 og CPR pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *For de udvalgte grupper er angivet antal prævalente tilfælde, mens sidste linje i tabellen angiver antal unikke prævalente personer. Tallene for de udvalgte grupper summerer derfor ikke nødvendigvis til "Kvinder i live (med tidligere kræftdiagnose)".

**Ekskl. basalcelle hudkræft

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker, hvor det er muligt at udlede det diskretionerede tal.


Prævalensopgørelsen tager ikke hensyn til, hvornår kræftsygdommen er diagnosticeret og således ikke, hvor længe personerne har overlevet siden diagnosetidspunktet. Tal for overlevelse efter kræft kan findes i publikationen [Kræftoverlevelse i Danmark, 2009-2023](#).

3.2 Udvikling i prævalensen 2015-2024

Prævalensen kan benyttes til at vurdere omfanget af personer med behov for opfølgning og rehabilitering inden for den enkelte kræftsygdom.

Figur 12 viser udviklingen i prævalente tilfælde, sammenholdt med udviklingen i incidensen, i de seneste 10 år (2015-2024) fordelt efter køn. Over hele perioden har der været en stigning i prævalensen for både mænd og kvinder.

Figur 12 Udviklingen i samlet prævalens og samlet incidens for mænd og kvinder, 2015-2024



Kilde: Cancerregisteret og CPR pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Bemærk at y-akserne er forskellige for hhv. prævalensen og incidensen.

Over hele perioden 2015-2024 er ratioen mellem prævalens og incidens steget for både mænd og kvinder, da stadig flere personer lever med kræft. Dette skyldes, at der over årene har været en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde, og at overlevelsen for en række kræftsygdomme gradvist er blevet forbedret. I 2024 var der 11.278 flere personer end i 2023, der levede med en kræftdiagnose, svarende til en stigning på 2,8 pct.

Udviklingen i prævalensen de seneste 10 år fordelt efter køn og udvalgte diagnosegrupper fremgår af tabellerne i Bilag 6.

Bilag 1. Efterregistreringer

Bilagstabel 1 Nye kræfttilfælde tilført efter første offentliggørelse og årgangenens udgangsværdi

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nye tilfælde ved publikationsåret	39 253	41 059	41 720	42 779	44 274	45 453	45 205	46 997	47 514	48 372	48 458
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2014	1 428										
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2015	1 104	1 174									
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2016	343	527	854								
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2017	288	308	1 143	1 327							
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2018	79	87	105	141	210						
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2019	- 21	- 41	- 46	-37	- 65	143					
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2020	95	60	- 124	-149	- 12	-292	- 17				
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2021	13	16	- 7	- 14	13	- 125	- 132	130			
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2022	0	- 12	- 4	- 1	18	13	29	48	241		
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2023	0	1	6	-3	10	3	17	22	8	146	
Total*	42 582	43 179	43 647	44 043	44 448	45 195	45 102	47 197	47 763	48 518	48 458

Note: *Baseret på Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Der er fra 2016 sket en ændring i de inkluderede grupper, der medtages i incidensberegningen for Cancerregisteret. Der er tilføjet seks diagnosegrupper under kategorierne lymfatisk- og bloddannende væv. Ændringen er tilbageført til 2004 og medfører en stigning i den samlede årlige incidens.

I 2016-2018 er der indhentet en større andel af de samlede kræfttilfælde direkte fra Patologiregisteret. Dette er sket som en konsekvens af manglende indberetninger fra flere regioner og kan være koblet til introduktionen af nye elektroniske patientjournaler (EPJ)-systemer. For visse kræftformer kan manglende indberetning fra sygehusniveauet ikke suppleres via Patologiregisteret, da diagnosen verificeres uden vævsprøver, fx svulster i hjerne og centralnervesystem og leukæmier.

Bemærk at tidligere steg incidensen for et år som regel ved senere opdatering af tallene, hvor tallet for den samlede incidens nu er faldet for fx 2020. Denne ændring i justeringen af den samlede incidens bagud i tid skyldes dels overgangen til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i 2019, som Cancerregisteret bygger på, og dels en øget oprensning af dobbelttumorer og tilfælde, som ved nærmere undersøgelse viser sig ikke at være kræft. Læs mere om overgangen til LPR3 [her](#).

Bilag 2. Diagnosekoder for udvalgte grupper

Bilagstabel 2 ICD-10 gruppering af udvalgte grupper af kræftsygdomme

Anvendt klassifikation	ICD-10
Hoved-halskræft inkl. kræft i skjoldbruskkirtlen	C00-14, C30-32, C73
Tyktarmskræft inkl. overgang til endetarm	C18-19
Endetarmskræft	C20
Kræft i lunge, bronkier og luftrør	C33-34
Modermærkekræft i hud	C43
Anden hudkræft, ekskl. basalcelle hudkræft	C44
Brystkræft (kvinder)	C50
Livmoderhalskræft	C53
Livmoderkræft	C54-55
Kræft i æggestokkene inkl. kræft i æggeledere og nærliggende bindevæv	C56, C570-4
Prostatakræft	C61
Testikelkræft	C62
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	C64-68, D090-091, D095-096, D301-309, D411-419 Yderligere er D-koderne afgrænset ved ICD-O-1-4 morfologierne 812xx-813xx
Hjerne og centralnervesystem	C70-72, C751-753, D32-33, D352-354, D42-43, D443, D444, D445

Bilag 3. Nye kræfttilfælde fordelt på udvalgte grupper

Bilagstabel 3 Nye kræfttilfælde for mænd fordelt på udvalgte grupper, 2015 - 2024

Mænd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	1 017	1 076	1 072	1 070	1 081	1 103	1 223	1 196	1 070	1 110
Tyktarm	1 989	1 951	1 919	1 710	1 665	1 600	1 640	1 535	1 549	1 487
Endetarm	1 090	978	1 007	958	893	819	932	824	794	781
Lunge, bronkier og luftrør	2 340	2 371	2 440	2 408	2 420	2 488	2 509	2 508	2 494	2 394
Modermærkekræft i hud	1 036	1 220	1 256	1 356	1 328	1 317	1 402	1 479	1 516	1 536
Anden hudkræft*	1 744	1 884	1 908	2 139	2 097	2 609	2 828	2 887	3 086	3 119
Prostata	4 599	4 594	4 421	4 666	4 523	4 479	4 636	4 718	4 412	4 446
Testikel	289	342	285	285	340	326	298	290	333	279
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	2 414	2 438	2 559	2 394	2 583	2 596	2 727	2 608	2 748	2 740
Hjerne og centralnervesystem	879	946	805	909	1 030	896	879	984	1 053	1 021
Øvrige	5 035	5 009	5 249	5 298	5 498	5 292	5 683	5 667	5 676	5 881
Total	22 432	22 809	22 921	23 193	23 458	23 525	24 757	24 696	24 731	24 794

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilagstabel 4 Nye kræfttilfælde for kvinder fordelt på udvalgte grupper, 2015 - 2024

Kvinder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	617	688	703	698	745	749	782	792	843	791
Tyktarm	1 876	1 793	1 810	1 618	1 713	1 600	1 703	1 676	1 555	1 747
Endetarm	697	592	639	587	580	520	509	514	509	452
Lunge, bronkier og luftrør	2 365	2 388	2 441	2 519	2 534	2 621	2 700	2 709	2 779	2 783
Modermærkekræft i hud	1 268	1 392	1 257	1 444	1 425	1 398	1 511	1 570	1 541	1 497
Anden hudkræft*	1 282	1 387	1 453	1 630	1 613	2 090	2 247	2 434	2 589	2 645
Bryst	4 827	4 869	4 895	4 995	5 115	4 862	5 062	5 159	5 415	5 389
Livmoderhals	362	343	372	333	355	306	274	338	336	326
Livmoder	848	822	805	796	838	824	827	831	837	769
Æggestok	539	550	547	544	537	580	529	535	552	491
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	1 037	981	991	1 016	948	949	980	986	1 081	1 059
Hjerne og centralnervesystem	1 088	1 221	1 153	1 209	1 370	1 162	1 181	1 266	1 424	1 417
Øvrige	3 941	3 812	4 056	3 866	3 964	3 916	4 135	4 257	4 326	4 298
Total	20 747	20 838	21 122	21 255	21 737	21 577	22 440	23 067	23 787	23 664

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilagstabel 5 Aldersstandardiseret* incidensrate for mænd (pr. 100.000 mænd)
fordelt på udvalgte grupper, 2015 - 2024

Mænd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	32,4	33,8	33,1	32,4	32,3	32,4	35,6	34,3	30,7	31,3
Tyktarm	63,6	61,9	58,6	52,4	50,0	47,6	48,4	44,0	43,8	41,2
Endetarm	34,6	30,7	30,9	29,0	26,5	24,4	27,1	23,8	22,5	21,9
Lunge, bronkier og luftrør	75,5	73,7	74,2	71,5	70,3	71,3	69,7	68,5	67,0	62,8
Modermærkekræft i hud	34,5	40,3	40,5	42,8	41,8	41,0	42,3	44,1	44,3	44,2
Anden hudkræft**	62,3	65,3	64,1	70,5	66,4	79,4	84,2	83,8	86,9	85,0
Prostata	142,3	139,2	131,9	135,5	129,0	125,1	127,3	127,5	117,5	116,8
Testikel	10,9	13,1	10,7	10,7	12,6	12,1	11,2	10,7	12,2	10,0
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	79,5	77,3	79,3	73,0	76,8	75,7	77,9	73,4	75,5	74,6
Hjerne og centralnervesystem	29,1	31,3	25,8	29,2	32,9	28,0	27,4	30,3	32,3	30,8
Øvrige	165,7	160,3	165,1	162,9	165,4	155,7	164,6	161,6	159,2	162,2
Total	730,4	726,8	714,1	709,9	704,1	692,5	715,6	701,9	691,7	680,6

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilagstabel 6 Aldersstandardiseret* incidensrate for kvinder (pr. 100.000 kvinder)
fordelt på udvalgte grupper, 2015 - 2024

Kvinder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	19,3	21,5	21,7	20,9	22,5	22,6	22,9	23,2	24,1	22,3
Tyktarm	52,3	49,3	48,7	43,2	45,0	41,4	42,9	41,4	38,1	41,6
Endetarm	20,0	16,6	17,9	16,2	15,8	13,8	13,3	13,4	13,4	11,4
Lunge, bronkier og luftrør	66,5	66,0	65,9	66,8	65,7	66,6	67,4	66,2	66,8	65,9
Modermærkekræft i hud	41,0	44,6	39,3	45,1	43,9	42,9	45,5	45,7	44,7	42,2
Anden hudkræft**	34,4	36,5	37,5	41,8	40,4	51,3	54,4	57,3	59,9	59,9
Bryst	145,3	147,2	145,8	146,8	149,3	139,8	142,9	144,7	150,0	149,0
Livmoderhals	12,6	12,1	13,0	11,5	12,3	10,6	9,6	12,1	11,5	11,1
Livmoder	24,2	23,4	22,6	21,7	22,8	21,9	21,9	21,6	21,8	19,6
Æggestok	15,8	15,9	15,7	15,1	14,9	16,0	14,4	14,3	14,6	12,9
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	29,4	27,9	27,3	27,5	25,1	24,9	25,1	24,7	26,7	25,4
Hjerne og centralnervesystem	34,1	38,9	35,6	37,1	42,1	36,0	35,8	37,7	41,8	41,5
Øvrige	113,2	108,7	113,2	105,9	107,2	103,8	107,1	109,3	109,9	107,1
Total	608,2	608,6	604,1	599,5	606,8	591,6	603,1	611,6	623,1	609,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilag 4. Nye kræfttilfælde fordelt på hovedgrupper efter ICD10

Bilagstabel 7 Antal nye kræfttilfælde (incidens) i 2023 og 2024 fordelt på hovedgrupper efter ICD10

Hovedgruppe	2023			2024		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
Mundhule og svælg	706	389	1 095	730	384	1 114
Fordøjelsesorganer	4 641	3 690	8 331	4 646	3 851	8 497
Luftveje og respirationsorganer	2 843	2 913	5 756	2 777	2 915	5 692
Knogler og ledbrusk	30	30	60	44	23	67
Hud*	4 602	4 130	8 732	4 655	4 142	8 797
Mesoteliom og bindevæv	168	164	332	194	190	384
Bryst	45	5 415	5 460	49	5 389	5 438
Kvindelige kønsorganer	-	1 889	1 889	-	1 763	1 764
Mandlige kønsorganer	4 838	-	4 838	4 809	-	4 809
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	2 748	1 081	3 829	2 740	1 059	3 799
Hjerne, centralnervesystem og øje	1 111	1 472	2 583	1 071	1 478	2 549
Endokrine kirtler	170	394	564	198	365	563
Lymfatisk væv	1 603	1 374	2 977	1 667	1 286	2 953
Bloddannende væv	991	632	1 623	975	598	1 573
Anden og dårligt specificeret kræft	235	214	449	238	221	459
Total	24 731	23 787	48 518	24 794	23 664	48 458

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Beskrivelse af diagnoseinddelingen er tilgængelig på eSundhed under 'Dokumentation' [her](#).

Bilagstabel 8 Antal nye kræfttilfælde (incidens) for basalcelle hudkræft og carcinoma in situ i bryst i 2023 og 2024

Gruppe	2023			2024		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
Basalcelle hudkræft	7 759	8 771	16 530	8 042	8 965	17 007
Carcinoma in situ i bryst	5	621	626	1-4	698	705

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker, hvor det er muligt at udlede det diskretionerede tal.

Bilagstabel 9 Aldersstandardiseret* incidensrate (pr. 100.000 personer) i 2023 og 2024 fordelt på hovedgrupper efter ICD-10 gruppering

Hovedgruppe	2023		2024	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Mundhule og svælg	19,9	10,3	20,4	10,0
Fordøjelsesorganer	129,7	91,4	127,4	92,8
Luftveje og respirationsorganer	76,6	70,3	73,1	69,2
Knogler og ledbrusk	0,9	0,9	1,4	0,7
Hud**	131,1	104,6	129,1	102,1
Mesoteliom og bindevæv	5,0	4,6	5,7	5,3
Bryst	1,2	150,0	1,3	149,0
Kvindelige kønsorganer	-	51,9	-	48,0
Mandlige kønsorganer	132,4	-	129,1	-
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	75,5	26,7	74,6	25,4
Hjerne, centralnervesystem og øje	34,0	43,2	32,3	43,2
Endokrine kirtler	5,5	12,3	6,2	11,3
Lymfatisk væv	45,5	35,2	46,5	32,5
Bloddannende væv	27,8	16,5	27,2	15,2
Anden og dårligt specificeret kræft	6,6	5,2	6,5	5,1
Total	691,7	623,1	680,6	609,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft.

Beskrivelse af diagnoseinddelingen er tilgængelig på eSundhed under 'Dokumentation' [her](#).

Bilagstabel 10 Aldersstandardiseret* incidensrate (pr. 100.000 personer) for
basalcelle hudkræft og carcinoma in situ i bryst i 2023 og 2024

Hovedgruppe	2023		2024	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Basalcelle hudkræft	221,8	231,9	225,7	234,9
Carcinoma in situ i bryst	0,1	17,9	0,1	20,5

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

Bilag 5. Nye kræfttilfælde og alder

Bilagstabel 11 Antal nye tilfælde for udvalgte kræftformer for mænd fordelt på alder, 2024

Mænd	0-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Total
Hoved og hals	1-4	15	51	242	519	281	1 110
Tyktarm	1-4	13	35	176	530	731	1 490
Endetarm	0	1-4	28	133	341	276	781
Lunge, bronkier og luftrør	0	1-4	12	183	1 064	1 134	2 394
Modermærkekræft i hud	0	26	89	319	527	575	1 536
Anden hudkræft*	0	0	18	167	787	2 147	3 119
Prostata	0	0	5	384	2 264	1 793	4 446
Testikel	1-4	90	118	48	17	5	280
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	7	9	71	344	1 137	1 172	2 740
Hjerne og centralnervesystem	22	67	117	250	315	250	1 021
Øvrige	59	86	192	786	2 345	2 413	5 881
Total	95	310	736	3 032	9 846	10 777	24 794

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker, hvor det er muligt at udlede det diskretionerede tal.

Bilagstabel 12 Antal nye tilfælde for udvalgte kræftformer for kvinder fordelt på alder, 2024

Kvinder	0-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Total
Hoved og hals	1-4	30	79	195	301	185	790
Tyktarm	1-4	17	42	170	570	945	1 750
Endetarm	0	1-4	21	64	182	182	450
Lunge, bronkier og luftrør	0	1-4	21	261	1 308	1 192	2 785
Modermærkekraft i hud	0	24	163	418	446	446	1 497
Anden hudkræft*	0	6	19	216	687	1 717	2 645
Bryst	0	23	434	1 496	1 786	1 650	5 389
Livmoderhals	0	6	118	98	73	31	326
Livmoder	0	1-4	21	153	335	259	770
Æggestok	0	6	22	107	187	169	491
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	1-4	1-4	16	121	444	471	1 060
Hjerne og centralnervesystem	27	99	198	341	411	341	1 417
Øvrige	45	58	165	573	1 549	1 908	4 298
Total	80	275	1 319	4 213	8 279	9 496	23 664

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker, hvor det er muligt at udlede det diskretionerede tal.

Bilag 6. Prævalens fordelt på køn og udvalgte grupper

Bilagstabel 13 Prævalens hos mænd fordelt på udvalgte grupper, 2015-2024

Mænd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	7 440	7 744	8 022	8 283	8 491	8 774	9 104	9 405	9 571	9 793
Tyktarm	10 720	11 536	12 231	12 651	13 057	13 314	13 581	13 700	13 846	13 945
Endetarm	7 304	7 602	7 928	8 166	8 341	8 408	8 612	8 684	8 712	8 739
Lunge, bronkier og luftrør	4 720	5 015	5 345	5 702	6 021	6 288	6 584	6 820	7 051	7 211
Modermærkekræft i hud	11 325	12 104	12 900	13 722	14 475	15 252	16 065	16 867	17 730	18 583
Anden hudkræft*	10 551	11 454	12 279	13 194	14 041	15 334	16 708	17 990	19 405	20 762
Prostata	36 248	38 440	40 329	42 342	44 135	45 629	47 277	48 835	49 928	51 048
Testikel	8 573	8 783	8 931	9 074	9 267	9 438	9 601	9 723	9 912	10 041
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	18 219	18 860	19 716	20 272	21 009	21 643	22 409	22 965	23 666	24 311
Hjerne og centralnervesystem	7 349	7 781	8 096	8 450	8 952	9 300	9 681	10 100	10 540	11 000
Anden kræft	24 929	26 237	27 606	28 924	30 233	31 355	32 701	33 824	34 898	36 299
Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)	133 863	140 739	146 960	152 838	158 696	164 017	169 971	175 236	180 051	185 007

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025 og CPR pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilagstabel 14 Prævalens hos kvinder fordelt på udvalgte grupper, 2015-2024

Kvinder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hoved og hals	5 873	6 228	6 539	6 859	7 224	7 575	7 957	8 356	8 797	9 152
Tyktarm	11 994	12 530	13 121	13 425	13 877	14 243	14 549	14 876	15 085	15 514
Endetarm	5 229	5 389	5 631	5 785	5 892	5 947	6 007	6 093	6 186	6 198
Lunge, bronkier og luftrør	5 800	6 231	6 717	7 301	7 779	8 259	8 841	9 275	9 882	10 403
Modermærkekraft i hud	16 692	17 680	18 499	19 467	20 427	21 312	22 319	23 349	24 282	25 154
Anden hudkræft*	8 819	9 518	10 225	11 052	11 839	13 066	14 346	15 698	17 181	18 660
Bryst	64 569	66 552	68 379	70 233	72 258	73 973	75 649	77 269	79 098	80 963
Livmoderhals	8 759	8 761	8 815	8 837	8 871	8 872	8 842	8 839	8 875	8 891
Livmoder	11 000	11 101	11 237	11 352	11 506	11 621	11 722	11 811	11 911	12 035
Æggestok	4 641	4 666	4 755	4 790	4 851	4 894	4 934	4 984	5 053	5 069
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	7 406	7 665	7 973	8 278	8 558	8 759	9 054	9 286	9 568	9 886
Hjerne og centralnervesystem	10 334	11 018	11 653	12 265	13 078	13 694	14 268	14 931	15 747	16 553
Anden kræft	21 965	22 972	24 188	25 060	26 030	26 963	28 054	29 024	30 191	31 216
Kvinder i live (med tidligere kræftdiagnose)	168 063	174 206	180 422	186 327	192 526	198 269	204 194	210 085	216 559	222 881

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025 og CPR pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Fra 2020 er keratoakantom (variant af højt differentieret planocellulært karcinom) tilføjet gruppen "Anden hudkræft" og tæller med i gruppen fra 2020. Ifølge WHO ICDO3-version 3.2 skal keratoakantom inkluderes i maligne incidente tilfælde. Ændringen medfører en stigning i den samlede årlige incidens i 2020 på ca. 800 tilfælde.

Bilag 7. Regionsfordeling

Bilagstabel 15 Antal nye tilfælde for mænd fordelt på udvalgte grupper og region, 2024

Mænd	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	119	241	231	339	180
Tyktarm	142	329	384	370	262
Endetarm	87	158	174	212	150
Lunge, bronkier og luftrør	262	562	602	552	416
Modermærkekræft i hud	138	320	421	434	223
Anden hudkræft*	292	619	860	853	495
Prostata	470	1 114	1 201	1 096	565
Testikel	30	73	58	88	30
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	325	625	656	688	445
Hjerne og centralnervesystem	115	198	243	304	161
Øvrige	635	1 327	1 397	1 587	935
Total	2 615	5 566	6 227	6 523	3 862

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 16 Aldersstandardiseret* incidensrate for mænd (pr. 100.000 mænd)
fordelt på udvalgte grupper og region, 2024

Mænd	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	31,3	30,4	29,3	34,2	30,9
Tyktarm	35,6	40,6	47,1	37,3	44,4
Endetarm	22,5	19,3	22,0	21,5	26,0
Lunge, bronkier og luftrør	62,5	65,5	68,3	54,0	66,5
Modermærkekræft i hud	36,2	40,1	55,9	44,3	39,3
Anden hudkræft**	71,0	74,7	102,0	87,5	82,0
Prostata	111,7	128,3	137,8	108,2	88,9
Testikel	10,7	11,7	10,8	8,9	7,8
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	80,0	75,1	78,9	68,9	73,9
Hjerne og centralnervesystem	33,1	26,3	34,6	31,1	30,8
Øvrige	159,8	161,4	170,8	159,4	156,9
Total	654,2	673,4	757,4	655,2	647,4

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 17 Antal nye tilfælde for kvinder fordelt på udvalgte grupper og region, 2024

Kvinder	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	104	177	161	253	96
Tyktarm	205	356	429	465	292
Endetarm	46	94	106	129	77
Lunge, bronkier og luftrør	341	615	665	659	503
Modermærkekræft i hud	131	334	398	421	213
Anden hudkræft*	232	446	785	774	408
Bryst	553	1 151	1 152	1 676	857
Livmoderhals	19	72	95	91	49
Livmoder	80	160	174	229	126
Æggestok	55	109	125	138	64
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	125	242	233	269	190
Hjerne og centralnervesystem	128	246	315	481	247
Øvrige	448	950	991	1 226	683
Total	2 467	4 952	5 629	6 811	3 805

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 18 Aldersstandardiseret* incidensrate for kvinder (pr. 100.000 kvinder)
fordelt på udvalgte grupper og region, 2024

Kvinder	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	29,0	23,0	20,7	23,2	17,8
Tyktarm	44,2	38,3	45,3	39,3	42,6
Endetarm	11,7	10,4	12,4	11,3	11,4
Lunge, bronkier og luftrør	76,7	65,7	70,4	54,4	73,3
Modermærkekræft i hud	34,4	42,4	54,2	38,8	38,3
Anden hudkræft**	49,4	45,9	80,2	60,5	57,3
Bryst	146,8	144,5	144,4	156,2	149,5
Livmoderhals	5,8	11,1	15,4	9,5	11,8
Livmoder	19,7	18,4	20,5	20,0	19,8
Æggestok	13,0	12,7	14,7	12,5	10,9
Kræft i urinveje inkl. nyrekræft	28,5	26,0	24,8	22,6	28,4
Hjerne og centralnervesystem	37,9	32,6	43,5	45,4	48,3
Øvrige	104,1	105,8	111,7	105,7	107,6
Total	601,2	576,8	658,1	599,4	616,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilag 8. Primær lokalisation og køn

Bilagstabel 19 Incidens fordelt på primær lokalisation for mænd (M) og kvinder (K), 2015-2024

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Læbe	M	15	9	6	9	14	16	6	9	8	7
	K	5	12	5	10	10	8	5	8	5	1-4
Tunge	M	122	105	115	124	164	169	189	194	170	197
	K	52	50	49	66	79	80	75	90	94	95
Mundhule	M	161	155	168	144	150	166	168	150	135	140
	K	92	102	90	105	89	94	97	87	97	105
Spytkirtel	M	33	56	34	38	36	42	51	39	52	34
	K	37	31	38	36	38	29	31	49	47	34
Tonsil og mundsvælg	M	238	291	275	261	215	265	268	251	242	255
	K	93	86	106	104	88	82	113	96	107	109
Næsesvælg	M	12	17	12	21	12	13	12	18	15	23
	K	5	8	6	10	7	9	15	1-4	10	11
Andre dele af svælg	M	89	93	78	84	94	82	104	103	82	72
	K	15	17	13	23	15	15	31	24	27	27
Anden og dårligt specificeret lokalisation i læbe, mundhule og svælg	M	0	1-4	1-4	6	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
	K	0	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	0
Spiserør	M	410	384	416	477	431	389	352	378	318	385
	K	126	166	148	155	160	153	120	148	157	137
Mavesæk	M	406	413	436	474	498	513	622	524	591	618
	K	221	224	233	198	220	221	267	253	256	284
Tyndtarm	M	87	110	132	140	126	142	135	146	159	157
	K	75	90	111	103	112	112	131	123	148	129
Tyktarm (inkl. colon-rectosigmoideum)	M	1 989	1 951	1 919	1 710	1 665	1 600	1 640	1 535	1 549	1 487
	K	1 876	1 793	1 810	1 618	1 713	1 600	1 703	1 676	1 555	1 747
Endetarm	M	1 090	978	1 007	958	893	819	932	824	794	781
	K	697	592	639	587	580	520	509	514	509	452
Endetarmsåbning	M	36	51	47	41	38	60	59	53	41	67
	K	96	91	105	114	100	112	119	138	128	157
Lever	M	303	343	321	382	370	346	415	435	418	389
	K	115	141	131	171	152	156	162	176	186	196
Galdeblære og galdeveje	M	102	90	111	87	117	94	116	121	108	124
	K	129	102	124	115	134	135	155	147	173	165

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bugspytkirtel	M	509	512	573	562	596	613	629	596	656	628
	K	463	444	545	568	535	554	509	590	570	577
Anden og dårligt specificeret lokalisation i fordøjelsesorganer	M	1-4	1-4	7	1-4	7	10	16	6	7	10
	K	9	9	11	1-4	10	9	15	7	8	7
Næsehule, mellemøre og bihuler	M	44	42	46	45	42	36	46	48	46	45
	K	27	32	37	23	31	28	33	31	34	20
Strubehoved	M	192	187	204	201	198	165	217	200	165	159
	K	36	51	47	41	52	45	25	48	49	46
Lunge, bronkier og luftrør	M	2 340	2 371	2 440	2 408	2 420	2 488	2 509	2 508	2 494	2 394
	K	2 365	2 388	2 441	2 519	2 534	2 621	2 700	2 709	2 779	2 783
Brissel	M	5	7	12	15	22	20	25	37	25	40
	K	1-4	1-4	10	16	27	29	16	23	31	27
Hjerte og brysthule	M	6	5	5	1-4	1-4	1-4	1-4	5	1-4	1-4
	K	16	9	5	1-4	1-4	5	1-4	1-4	1-4	1-4
Lungehinde	M	119	104	120	124	143	119	109	108	109	137
	K	30	19	24	26	22	20	21	32	19	35
Anden og dårligt specificeret lokalisation i luftveje og respirationsorganer	M	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0
	K	1-4	0	1-4	0	0	0	0	0	0	0
Knogler og ledbrusk	M	35	39	30	40	53	29	34	32	30	44
	K	18	34	32	31	38	24	23	22	30	23
Modermærke	M	1 036	1 220	1 256	1 356	1 328	1 317	1 402	1 479	1 516	1 536
	K	1 268	1 392	1 257	1 444	1 425	1 398	1 511	1 570	1 541	1 497
Anden hud*	M	1 744	1 884	1 908	2 139	2 097	2 609	2 828	2 887	3 086	3 119
	K	1 282	1 387	1 453	1 630	1 613	2 090	2 247	2 434	2 589	2 645
Mesoteliom, anden lokalisation	M	10	8	11	17	10	10	12	13	10	11
	K	5	11	7	8	8	10	8	5	8	10
Kaposi sarkom	M	5	9	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5	1-4	7
	K	1-4	0	0	0	0	1-4	0	0	0	1-4
Perifere nerver og autonome nervesystem	M	1-4	0	1-4	0	0	0	1-4	1-4	1-4	1-4
	K	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Bughinde og bindevæv i bughulens bagvæg	M	13	10	21	17	16	20	17	16	22	16
	K	33	44	46	38	30	41	47	49	39	50
Andet bindevæv	M	84	100	87	108	121	101	106	129	133	159
	K	81	71	90	81	85	98	105	89	115	127
Bryst	M	42	46	36	40	54	43	41	38	45	49
	K	4 827	4 869	4 895	4 995	5 115	4 862	5 062	5 159	5 415	5 389

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ydre kvindelige kønsorganer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	139	129	133	120	95	128	112	123	121	130
Skede	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	21	24	25	30	28	29	34	16	31	27
Livmoderhals	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	362	343	372	333	355	306	274	338	336	326
Livmoder	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	848	822	805	796	838	824	827	831	837	769
Æggestok	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	539	550	547	544	537	580	529	535	552	491
Moderkage	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	0	1-4	1-4	1-4	1-4	0	0	1-4	0	1-4
Anden og dårligt specificeret lokalisation i kvindelige kønsorganer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	7	9	9	5	9	0	9	19	12	17
Penis	M	72	70	71	64	73	64	61	84	85	82
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostata	M	4 599	4 594	4 421	4 666	4 523	4 479	4 636	4 718	4 412	4 446
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testikel	M	289	342	285	285	340	326	298	290	333	279
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden og dårligt specificeret lokalisation i mandlige kønsorganer	M	12	5	9	1-4	1-4	5	1-4	5	8	1-4
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre	M	609	627	679	679	737	732	786	760	756	813
	K	348	331	303	345	309	314	329	356	382	348
Nyrebækken	M	52	66	55	48	67	68	59	60	54	65
	K	46	49	50	34	45	53	38	41	43	52
Urinleder	M	33	35	29	44	25	39	40	42	55	36
	K	10	21	14	14	14	22	20	20	27	22
Urinblære	M	1 625	1 611	1 682	1 499	1 632	1 624	1 707	1 618	1 751	1 692
	K	578	526	576	565	536	499	529	505	558	570
Anden og dårligt specificeret lokalisation i urinveje	M	95	99	114	124	122	133	135	128	132	134
	K	55	54	48	58	44	61	64	64	71	67
Øje	M	59	34	46	41	49	61	62	51	58	50
	K	46	39	49	39	61	39	63	43	48	61
Hjerne- og rygmærkshinder	M	160	213	181	222	219	177	179	207	214	202
	K	463	525	536	560	592	464	509	526	584	582

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hjerne	M	545	571	495	556	596	540	520	583	624	602
	K	465	538	489	480	572	531	516	569	630	627
Rygmarv, kranienerver og centralnervesystem	M	174	162	129	131	215	179	180	194	215	217
	K	160	158	128	169	206	167	156	171	210	208
Skjoldbruskkirtel	M	111	118	131	137	156	147	159	180	153	176
	K	255	298	312	279	334	356	355	355	371	341
Binyre	M	13	10	1-4	7	6	11	14	18	13	18
	K	6	8	9	11	15	12	25	27	22	19
Andre endokrine kirtler	M	1-4	1-4	1-4	5	1-4	1-4	1-4	8	1-4	1-4
	K	0	5	1-4	1-4	1-4	1-4	6	1-4	1-4	5
Hodgkin malignt lymfom	M	81	92	100	101	87	99	89	109	77	126
	K	62	71	69	62	66	74	66	68	58	78
Non-Hodgkin malignt lymfom	M	1 060	1 117	1 125	1 165	1 201	1 134	1 352	1 288	1 301	1 301
	K	773	867	887	839	875	897	946	984	1 001	942
Ondartet myeloproliferativ sygdom	M	1-4	1-4	0	0	0	0	1-4	1-4	1-4	5
	K	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	6	1-4	1-4
Polycytaemia vera	M	79	60	71	55	73	65	80	82	76	74
	K	87	68	65	76	74	43	76	79	93	69
Morbus myelo-proliferativus chronicus	M	86	101	119	118	107	130	109	117	90	97
	K	96	110	136	138	138	148	125	119	111	106
Thrombocytaemia essentialis (haemorrhagica)	M	43	60	47	61	61	52	52	55	46	58
	K	92	80	77	71	97	76	87	83	105	89
Hypereosinofilt syndrom	M	1-4	5	5	1-4	13	6	1-4	6	10	6
	K	6	1-4	0	5	18	6	0	1-4	1-4	1-4
Lymfatisk leukæmi	M	403	382	406	351	387	383	375	332	376	388
	K	264	198	223	215	233	207	273	247	202	200
Myeloid leukæmi	M	157	171	184	187	225	181	186	224	211	213
	K	159	135	163	160	143	172	143	199	166	146
Monocytleukæmi	M	28	43	45	42	57	80	84	94	80	94
	K	20	18	26	27	41	32	46	48	45	48
Anden leukæmi	M	9	14	15	18	35	26	20	23	17	22
	K	7	8	8	12	9	7	6	13	22	14
Anden og ikke spec. lymfatisk og bloddannende væv	M	13	11	14	12	22	18	10	15	13	17
	K	9	9	12	10	17	13	11	8	12	15
Myelodysplastiske syndromer	M	183	182	180	179	197	201	202	212	223	193
	K	127	101	110	102	148	96	140	112	138	135

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Primær og sekundær myelofibrose	M	59	44	46	39	57	58	48	41	71	48
	K	34	40	24	23	29	40	39	36	47	40
Metastaser og ikke specificeret kræft	M	406	298	328	234	159	135	143	168	120	149
	K	476	360	328	227	170	137	138	151	133	139
Anden og dårlig specificeret kræft	M	86	71	63	77	75	67	91	87	115	89
	K	85	70	71	59	57	75	83	61	81	82
Total	M	22 432	22 809	22 921	23 193	23 458	23 525	24 757	24 696	24 731	24 794
	K	20 747	20 838	21 122	21 255	21 737	21 577	22 440	23 067	23 787	23 664

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft

1-4- angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4-observationer i cellen.

Bilagstabel 20 Aldersstandardiseret* incidensrate (pr. 100.000) fordelt på primær
 lokalisation for mænd (M) og kvinder (K), 2015-2024

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Læbe	M	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	K	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Tunge	M	3,9	3,2	3,4	3,7	4,9	4,9	5,7	5,5	4,8	5,6
	K	1,6	1,5	1,4	1,9	2,2	2,2	2,1	2,5	2,6	2,5
Mundhule	M	5,0	4,8	5,2	4,2	4,4	4,7	4,7	4,2	3,7	3,9
	K	2,6	3,0	2,4	2,8	2,3	2,4	2,5	2,3	2,4	2,6
Spytkirtel	M	1,1	1,9	1,1	1,3	1,1	1,3	1,6	1,1	1,5	1,0
	K	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,8	0,9	1,4	1,3	1,0
Tonsil og mundsvælg	M	7,4	9,2	8,4	7,9	6,4	7,8	7,7	7,2	6,9	7,2
	K	2,8	2,6	3,2	3,0	2,5	2,3	3,1	2,6	2,9	2,9
Næsesvælg	M	0,4	0,6	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,7
	K	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3
Andre dele af svælg	M	2,8	2,8	2,4	2,4	2,7	2,3	2,9	2,8	2,2	1,9
	K	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7
Anden og dårligt specificeret lokalisation i læbe, mundhule og svælg	M	0	0,1	0,1	0,2	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	K	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0
Spiserør	M	13,0	12,0	12,7	14,2	12,5	11,2	9,9	10,5	8,7	10,4
	K	3,4	4,6	4,0	4,0	4,0	3,8	2,9	3,6	3,7	3,2
Mavesæk	M	13,2	13,1	13,6	14,7	14,9	15,1	17,7	14,7	16,3	16,7
	K	6,3	6,3	6,3	5,4	6,0	5,8	6,9	6,4	6,6	7,0
Tyndtarm	M	2,7	3,5	4,1	4,3	3,7	4,0	3,9	4,2	4,5	4,4
	K	2,1	2,6	3,0	2,9	3,1	3,0	3,4	3,2	3,9	3,2
Tyktarm (inkl. colon- rectosigmoideum)	M	63,6	61,9	58,6	52,4	50,0	47,6	48,4	44,0	43,8	41,2
	K	52,3	49,3	48,7	43,2	45,0	41,4	42,9	41,4	38,1	41,6
Endetarm	M	34,6	30,7	30,9	29,0	26,5	24,4	27,1	23,8	22,5	21,9
	K	20,0	16,6	17,9	16,2	15,8	13,8	13,3	13,4	13,4	11,4
Endetarmsåbning	M	1,2	1,6	1,5	1,3	1,1	1,8	1,7	1,5	1,2	1,9
	K	2,9	2,6	3,1	3,3	2,9	3,1	3,2	3,8	3,4	4,1
Lever	M	9,7	10,5	9,8	11,4	10,7	9,9	11,6	12,0	11,6	10,4
	K	3,3	4,0	3,7	4,6	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,8
Galdeblære og galdeveje	M	3,4	2,9	3,4	2,7	3,6	2,8	3,4	3,4	2,9	3,3
	K	3,7	2,7	3,3	3,0	3,5	3,5	3,9	3,5	4,2	3,9
Bugspytkirtel	M	16,1	15,9	17,6	17,0	17,4	17,6	17,8	16,6	18,1	17,1
	K	13,1	12,2	14,6	15,0	13,9	14,0	12,6	14,5	13,6	13,5

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anden og dårligt specificeret lokalisation i fordøjelsesorganer	M	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3
	K	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Næsehule, mellemøre og bihuler	M	1,6	1,3	1,5	1,4	1,3	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3
	K	0,8	1,0	1,1	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6
Strubehoved	M	6,0	5,8	6,2	5,9	5,8	4,7	6,1	5,5	4,6	4,2
	K	1,1	1,4	1,3	1,1	1,4	1,2	0,7	1,2	1,3	1,2
Lunge, bronkier og luftrør	M	75,5	73,7	74,2	71,5	70,3	71,3	69,7	68,5	67,0	62,8
	K	66,5	66,0	65,9	66,8	65,7	66,6	67,4	66,2	66,8	65,9
Brissel	M	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,6	0,7	1,0	0,7	1,2
	K	0,1	0,1	0,3	0,5	0,8	0,8	0,5	0,6	0,9	0,6
Hjerte og brysthule	M	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
	K	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Lungehinde	M	3,8	3,3	3,7	3,6	4,2	3,4	3,1	2,9	2,9	3,5
	K	0,8	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,8	0,5	0,8
Anden og dårligt specificeret lokalisation i luftveje og respirationsorganer	M	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knogler og ledbrusk	M	1,3	1,3	1,0	1,2	1,8	0,9	1,1	1,0	0,9	1,4
	K	0,6	1,2	1,1	1,0	1,2	0,8	0,7	0,7	0,9	0,7
Modermærke	M	34,5	40,3	40,5	42,8	41,8	41,0	42,3	44,1	44,3	44,2
	K	41,0	44,6	39,3	45,1	43,9	42,9	45,5	45,7	44,7	42,2
Anden hud*	M	62,3	65,3	64,1	70,5	66,4	79,4	84,2	83,8	86,9	85,0
	K	34,4	36,5	37,5	41,8	40,4	51,3	54,4	57,3	59,9	59,9
Mesoteliom, anden lokalisation	M	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
	K	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3
Kaposi sarkom	M	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,2
	K	0,0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0
Perifere nerver og autonome nervesystem	M	0,1	0	0,1	0	0	0	0,1	0,1	0	0
	K	0	0,1	0,1	0	0	0	0,1	0	0,1	0,1
Bughinde og bindevæv i bug hulens bagvæg	M	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,7	0,4
	K	0,9	1,2	1,4	1,1	0,8	1,1	1,3	1,3	1,0	1,2
Andet bindevæv	M	2,9	3,3	2,9	3,3	3,9	3,1	3,2	3,9	3,9	4,8
	K	2,6	2,4	2,7	2,4	2,5	2,9	3,0	2,5	3,4	3,8
Bryst	M	1,4	1,5	1,1	1,2	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,3
	K	145,3	147,2	145,8	146,8	149,3	139,8	142,9	144,7	150,0	149,0
Ydre kvindelige kønsorganer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	4,2	3,7	3,7	3,3	2,6	3,4	3,0	3,3	3,0	3,2

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skede	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	1,0	0,5	0,8	0,7
Livmoderhals	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	12,6	12,1	13,0	11,5	12,3	10,6	9,6	12,1	11,5	11,1
Livmoder	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	24,2	23,4	22,6	21,7	22,8	21,9	21,9	21,6	21,8	19,6
Æggestok	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	15,8	15,9	15,7	15,1	14,9	16,0	14,4	14,3	14,6	12,9
Moderkage	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0,1	0	0,1
Anden og dårligt specificeret lokalisation i kvindelige kønsorganer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0	0,2	0,4	0,3	0,4
Penis	M	2,4	2,4	2,3	2,0	2,2	2,0	1,8	2,4	2,4	2,2
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostata	M	142,3	139,2	131,9	135,5	129,0	125,1	127,3	127,5	117,5	116,8
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testikel	M	10,9	13,1	10,7	10,7	12,6	12,1	11,2	10,7	12,2	10,0
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden og dårligt specificeret lokalisation i mandlige kønsorganer	M	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre	M	19,3	19,4	20,7	20,5	21,9	21,2	22,7	21,9	21,2	23,0
	K	10,2	9,7	8,6	9,7	8,6	8,6	8,9	9,4	9,9	8,8
Nyrebækken	M	1,7	2,1	1,7	1,4	2,0	2,0	1,7	1,6	1,5	1,7
	K	1,3	1,4	1,3	0,9	1,1	1,4	0,9	0,9	1,0	1,2
Urinleder	M	1,1	1,2	1,0	1,4	0,7	1,1	1,1	1,2	1,5	0,9
	K	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
Urinblære	M	54,2	51,5	52,4	46,0	48,7	47,5	48,6	45,1	47,8	45,4
	K	16,1	14,7	15,6	15,1	13,9	12,9	13,2	12,4	13,4	13,3
Anden og dårligt specificeret lokalisation i urinveje	M	3,2	3,2	3,5	3,7	3,5	3,9	3,8	3,6	3,6	3,6
	K	1,5	1,6	1,3	1,5	1,1	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6
Øje	M	1,9	1,1	1,5	1,3	1,6	1,9	1,9	1,5	1,7	1,5
	K	1,5	1,2	1,5	1,1	1,8	1,1	1,8	1,2	1,4	1,7
Hjerne- og rygmarvshinder	M	5,3	6,8	5,6	7,0	6,9	5,3	5,4	6,2	6,3	5,9
	K	14,1	15,7	15,7	16,5	17,1	13,6	14,5	14,9	16,6	15,9
Hjerne	M	18,2	19,0	16,1	18,0	19,1	17,1	16,3	18,1	19,2	18,4
	K	15,0	18,0	15,9	15,3	18,4	17,2	16,4	17,6	19,0	19,2

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rygmarv, kranienerver og centralnervesystem	M	5,6	5,4	4,1	4,3	6,9	5,6	5,8	6,0	6,8	6,6
	K	5,0	5,2	4,0	5,4	6,6	5,2	4,8	5,2	6,2	6,4
Skjoldbruskkirtel	M	3,8	3,9	4,3	4,4	5,0	4,7	5,1	5,6	4,9	5,4
	K	8,6	9,9	10,6	9,1	11,2	11,8	11,5	11,5	11,6	10,5
Binyre	M	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
	K	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,8	0,9	0,7	0,6
Andre endokrine kirtler	M	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0	0	0,3	0,1	0,1
	K	0	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0,2	0,1	0	0,2
Hodgkin malignt lymfom	M	2,9	3,1	3,4	3,4	2,9	3,2	2,8	3,4	2,5	4,0
	K	2,1	2,5	2,4	2,0	2,1	2,4	2,1	2,1	1,8	2,5
Non-Hodgkin malignt lymfom	M	34,9	35,8	35,3	36,1	36,0	33,3	39,4	36,8	36,5	35,7
	K	22,0	24,4	24,5	22,6	23,5	23,7	24,2	25,2	25,2	23,2
Ondartet myeloproliferativ sygdom	M	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2
	K	0,1	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Polycytaemia vera	M	2,5	2,0	2,3	1,7	2,2	1,9	2,4	2,4	2,2	2,1
	K	2,5	1,9	1,8	2,2	2,0	1,1	1,9	2,0	2,3	1,7
Morbus myelo-proliferativus chronicus	M	2,9	3,2	3,8	3,6	3,2	3,9	3,2	3,3	2,5	2,7
	K	2,8	3,1	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	2,9	2,8	2,6
Thrombocytaemia essentialis (haemorrhagica)	M	1,5	1,9	1,5	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6	1,4	1,7
	K	2,8	2,3	2,1	2,1	2,7	2,2	2,3	2,3	2,9	2,4
Hypereosinofilt syndrom	M	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
	K	0,2	0,1	0	0,2	0,5	0,2	0	0,1	0,1	0
Lymfatisk leukæmi	M	13,3	12,6	12,9	10,8	11,8	11,2	11,1	9,8	10,8	11,1
	K	7,6	5,7	6,4	6,2	6,3	5,5	7,2	6,6	5,4	5,2
Myeloid leukæmi	M	5,4	5,5	6,1	5,9	7,0	5,5	5,6	6,6	6,1	6,0
	K	4,7	4,1	4,8	4,5	4,1	4,7	3,8	5,6	4,6	3,9
Monocytleukæmi	M	1,1	1,4	1,4	1,4	1,7	2,4	2,5	2,6	2,1	2,5
	K	0,6	0,5	0,7	0,7	1,0	0,8	1,1	1,1	1,0	1,1
Anden leukæmi	M	0,3	0,5	0,5	0,6	1,1	0,8	0,6	0,7	0,5	0,7
	K	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,5	0,4
Anden og ikke spec. lymfatisk og bloddannende væv	M	0,5	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5
	K	0,3	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,5	0,5
Myelodysplastiske syndromer	M	6,3	6,1	5,7	5,7	6,1	5,9	5,8	6,0	6,0	5,1
	K	3,6	2,8	3,0	2,7	3,8	2,4	3,4	2,7	3,2	3,2
Primær og sekundær myelofibrose	M	1,9	1,4	1,4	1,2	1,7	1,7	1,4	1,1	1,9	1,3
	K	1,0	1,1	0,6	0,6	0,7	1,1	1,0	0,9	1,2	1,0

	Køn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metastaser og ikke specificeret kræft	M	13,6	9,7	10,6	7,3	4,9	4,0	4,1	4,7	3,3	4,1
	K	13,3	10,0	8,9	6,0	4,4	3,5	3,3	3,7	3,2	3,2
Anden og dårlig specificeret kræft	M	2,9	2,4	2,0	2,4	2,4	2,0	2,7	2,5	3,3	2,5
	K	2,4	1,9	2,0	1,5	1,5	1,8	2,1	1,5	2,0	1,9
Total	M	730,4	726,8	714,1	709,9	704,1	692,5	715,6	701,9	691,7	680,6
	K	608,2	608,6	604,1	599,5	606,8	591,6	603,1	611,6	623,1	609,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 2. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.00 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

**Ekskl. basalcelle hudkræft