




RAPPORT

2026

Kræftoverlevelse i Danmark

Cancerregisteret

2010-2024



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Design	1.0
Versionsdato	26. februar 2026
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Kræftoverlevelse i Danmark

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Kræftoverlevelse i Danmark fra 2010 til 2024.....	4
1.1	1-årsoverlevelse for alle kræftformer.....	5
1.2	5-årsoverlevelse for alle kræftformer.....	6
1.3	Udviklingen i overlevelsen for 21 udvalgte kræftformer	7
1.4	1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer.....	8
1.5	5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer	9
	Bilagstabeller.....	12

1. Kræftoverlevelse i Danmark fra 2010 til 2024

Denne rapport belyser udviklingen i 1-års- og 5-årsoverlevelse for alle kræftformer samlet samt for 21 udvalgte kræftformer i perioden 2010-2024. Overlevelsen er beregnet som relativ overlevelse, jf. Tekstboks 1.

Prostatakræft og brystkræft udgør en betydelig del af den samlede kræftforekomst og har derfor markant indflydelse på den samlede overlevelse (for begge kræftformer i positiv retning), jf. Tekstboks 2 side 7. I rapporten præsenteres den samlede overlevelse både inklusiv og eksklusiv disse to kræftformer.

Foruden nærværende rapport foreligger 3-års- og 10-årsoverlevelse, regionale fordelinger samt dokumentation af metoder på sundhedsdatabank.dk - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata: [Link til opgørelse af kræftoverlevelse 2010-2024 på Sundhedsdatabanken.](#)

Tekstboks 1: Relativ overlevelse

Overlevelsen måles som den aldersstandardiserede relative overlevelse henholdsvis et og fem år efter en kræftdiagnose. Relativ overlevelse kan fortolkes som sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom i en given periode, hvis kræftsygdommen var eneste mulige dødsårsag. Den relative overlevelse beregnes som forholdet mellem den observerede overlevelse blandt personer med kræft og den forventede overlevelse for en køn- og aldersmæssig tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der antages ikke at have den pågældende kræftdiagnose.

Kræfttilfældene er opdelt i 3-års diagnoseperioder, som refererer til årene for diagnose. 95 procent (pct.) sikkerhedsinterval er angivet i parentes.


1.1 1-årsoverlevelse for alle kræftformer

For personer diagnosticeret i 2022-2024 er den samlede 1-årsoverlevelse for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft¹ end modermærkekræft)² på 86 pct. for kvinder og 84 pct. for mænd, jf. Figur 1 og bilagstabel 2.

Ved yderligere eksklusion af prostata- og brystkræft er den samlede 1-årsoverlevelse for personer diagnosticeret i 2022-2024 på 81 pct. for kvinder og 80 pct. for mænd, jf. Figur 1 og bilagstabel 2.

I perioden fra 2010-2012 til 2022-2024 ses en stigning i 1-årsoverlevelsen efter kræft fra 78 pct. til 86 pct. for kvinder og fra 77 pct. til 84 pct. for mænd, jf. Figur 1 og bilagstabel 2. Sammenlignet med perioden 2019-2021 er 1-årsoverlevelsen for perioden 2022-2024 1 procentpoint højere for kvinder, mens den er den samme for mænd.

Figur 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakkræft), 2010-2012 til 2022-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til diagnoseår.

¹ Eksklusiv basalcelle hudkræft.


² Anden hudkræft end modermærkekræft medregnes ikke, da disse kræftformer sjældent er dødelige.

1.2 5-årsoverlevelse for alle kræftformer

I perioden 2022-2024 er den samlede 5-årsoverlevelse 74 pct. for kvinder og 71 pct. for mænd for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft), jf. Figur 2. I perioden fra 2010-2012 til 2022-2024 ses en stigning i 5-årsoverlevelsen efter kræft fra 64 pct. til 74 pct. for kvinder og fra 61 pct. til 71 pct. for mænd, jf. Figur 2 og bilagstabel 3. Sammenlignet med perioden 2019-2021 er 5-årsoverlevelsen for perioden 2022-2024 steget med 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder. Det er en positiv udvikling, da selv en stigning på 1-2 procentpoint på tværs af alle kræftformer omfatter et meget stor antal patienter.

Når mænd med prostatakræft og kvinder med brystkræft ikke medregnes, er den samlede 5-årsoverlevelse for personer diagnosticeret i 2022-2024 på 67 pct. for kvinder og 64 pct. for mænd. Sammenlignet med perioden 2010-2012 svarer det til en stigning i overlevelsen på 12 procentpoint for begge køn jf. Figur 2 og bilagstabel 3.

Figur 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft (eksklusiv anden hudkræft end modermærkekræft) for kvinder (i alt og eksklusiv brystkræft) og mænd (i alt og eksklusiv prostatakræft), 2010-2012 til 2022-2024



Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne refererer til diagnoseår.

1.3 Udviklingen i overlevelsen for 21 udvalgte kræftformer

Den stigende tendens i 1- og 5-årsoverlevelsen for kvinder og mænd siden perioden 2010-2012 ses for de fleste af de udvalgte kræftformer, jf. Bilagstabel 2 og Bilagstabel 3. Dog har overlevelsen for prostata-, testikel-, bryst- og modermærke-, hud- og skjoldbruskkirtelkræft i hele perioden ligget forholdsvis højt.

Den største stigning i 1-årsoverlevelsen ses for lungekræft hos kvinder (fra 45 pct. i 2010-2012 til 64 pct. i 2022-2024) og for leverkræft hos mænd (fra 28 pct. i 2010-2012 til 48 pct. i 2022-2024) jf. Bilagstabel 2. Den største stigning i 5-årsoverlevelsen ses for lungekræft hos kvinder og for nyrekræft hos mænd i perioden fra 2010-2012 til 2022-2024 jf. Bilagstabel 3. 5-årsoverlevelsen for lungekræft er steget med 19 procentpoint for kvinder og 14 procentpoint for mænd, hvilket for begge køn svarer til en fordobling. I samme periode er 5-årsoverlevelsen for nyrekræft steget med 18 procentpoint for mænd og 19 procentpoint for kvinder jf. Bilagstabel 3. Der ses desuden en stor stigning i 5-årsoverlevelsen for bugspytkirtelkræft hos mænd fra 6 pct. i 2010-2012 til 17 pct. i 2022-2024 svarende til en næsten tredobling af overlevelsen. Leverkræft er også en kræftform, hvor stigningen i overlevelsen er opmuntrende, da prognosen oftest er alvorlig. For kvinder er 1-årsoverlevelsen for leverkræft steget fra 36 pct. i 2010-2012 til 44 pct. i 2022-2024, mens den for mænd i samme periode nærmer sig en fordobling fra 28 pct. til 48 pct. jf. Bilagstabel 2.

Tekstboks 2: Diagnostisk aktivitet

I årene frem til 2009 blev den diagnostiske aktivitet for prostatakræft og brystkræft øget med henblik på tidlig opsporing og diagnose. Det indebar øget brug af PSA-måling³ og udrulning af mammografi-screening til hele Danmark i 2007-2009. Disse tiltag kan være medvirkende til den forbedrede overlevelse, der er observeret i de efterfølgende år.

I foråret 2014 blev nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft implementeret, og overlevelsestallene for disse kræftsygdomme skal ses i lyset af dette.

Øget diagnostisk aktivitet kan påvirke overlevelsestallene på flere måder. Det kan føre til, at kræften opdages på et tidligere tidspunkt, og personer med kræft derfor lever længere efter diagnosetidspunktet, men uden at deres samlede levetid forlænges (lead time bias). Derudover kan man finde flere langsomt voksende kræftsvulster end tidligere, hvorved flere mindre aggressive kræfttilfælde med bedre prognose vil indgå i overlevelseseberegningerne (length time bias).

³ prostata-specifikt-antigen (PSA) målt ved blodprøve.

1.4 1-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

Hos både mænd og kvinder er 1-årsoverlevelsen for leverkræft steget med 4 procentpoint fra i 2019-2021 til 2022-2024, jf. Tabel 1. For mænd er overlevelsen for hjernetumorer i samme periode steget med 3 procentpoint fra 76 pct. til 79 pct.

Hos mænd er 1-årsoverlevelsen desuden steget med 1-2 procentpoint for nyre-, lunge-, lymfe- og modermærkekræft fra 2019-2021 til 2022-2024, mens overlevelsen for spiserørs-, tyk- og endetarms-, blære- og skjoldbruskkirtelkræft i samme periode er faldet med 1-2 procentpoint. 1-årsoverlevelsen for de øvrige kræftformer er uændret hos mænd.

Blandt kvinder er 1-årsoverlevelsen for langt de fleste kræftformer steget fra 2019-2021 til 2022-2024, heriblandt er overlevelsen for mavesæks-, lunge-, æggestok-, nyrekræft alle steget med 2-3 procentpoint i perioden. For lungekræft er 1-årsoverlevelsen eksempelvis steget fra 61 pct. i 2021 til 64 pct. i 2022-2024. I samme periode er 1-årsoverlevelsen faldet 1 procentpoint for blærekræft.

Der observeres et markant fald på 8 procentpoint i 1-årsoverlevelsen mellem de to seneste perioder for spiserørskræft blandt kvinder. Forskellene mellem de to perioder bør fortolkes med forsigtighed, da spiserørskræft er en relativt sjælden kræftform, især blandt kvinder, hvilket medfører betydelig statistisk usikkerhed i estimerterne. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at 5-årsoverlevelsen i samme periode udviser en stigende tendens (fra 20 pct. til 26 pct.), jf. Tabel 2.

Tabel 1 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 21 udvalgte kræftformer, 2019-2021 til 2022-2024

	Kvinder		Mænd	
	2019-2021	2022-2024	2019-2021	2022-2024
Hoved-halskræft	86 (84-88)	87 (85-89)	85 (83-86)	85 (84-87)
Spiserørskræft	54 (50-58)	46 (39-53)	49 (45-52)	47 (43-50)
Mavesækskræft	62 (58-66)	64 (60-67)	61 (58-63)	61 (58-63)
Tyk- og endetarmskræft	88 (87-88)	88 (87-89)	88 (87-88)	87 (87-88)
Leverkræft	40 (35-45)	44 (39-48)	44 (41-48)	48 (45-52)
Bugspytkirtelkræft	40 (38-43)	40 (38-43)	39 (36-41)	39 (37-41)
Lungekræft (inkl. luftrør)	61 (60-62)	64 (63-65)	53 (52-55)	55 (53-56)
Modermærkekræft (malignt melanom)	99 (99-100)	99 (99-100)	98 (98-99)	99 (98-99)
Hudkræft (ekskl. modermærkekræft)	99 (99-100)	100 (99-100)	98 (98-99)	98 (98-99)
Brystkræft	97 (97-98)	98 (97-98)		
Livmoderhalskræft	89 (87-92)	90 (87-92)		
Livmoderkræft	93 (92-94)	93 (92-94)		

Æggestokkræft	81 (79-83)	83 (81-85)		
Prostatakræft			99 (98-99)	99 (98-99)
Testikelkræft			99 (95-100)	-
Nyrekræft	91 (88-92)	93 (91-95)	91 (89-92)	93 (92-94)
Blærekræft	89 (87-90)	88 (86-90)	93 (92-94)	92 (91-93)
Hjernetumorer	79 (77-81)	80 (79-82)	76 (74-78)	79 (77-80)
Skjoldbruskkirtelkræft	95 (94-97)	96 (94-97)	96 (94-98)	95 (92-96)
Lymfekræft	91 (90-92)	92 (91-93)	90 (89-91)	91 (90-92)
Blodkræft	90 (88-91)	90 (89-91)	89 (87-90)	89 (88-90)

Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 30 patienter i live ved periodestart og minimum 3 patienter i aldersgrupperne anvendt ved vægtning. For sjældne kræftformer eller kræftformer med få eller ingen dødsfald, kan kræftoverlevelsen ikke rapporteres, eksempelvis på grund af ustabile estimater og atypiske konfidensintervaller. Disse fremgår som "-"

3-års perioderne refererer til diagnoseår. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes.

Fra og med nærværende rapport - 'Kræftoverlevelse i Danmark 2010-2024' - er udvalgte grupper af kræftsygdomme udvidet til at inkludere 21 kræftformer i stedet for de hidtidige 15. Derudover er ICD-10 diagnoserne D459, D471, D473, D475 flyttet fra gruppen lymfekræft til blodkræft. Som følge af ændringerne er de udvalgte kræftformer i nærværende rapport ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende opgørelser i tidligere rapporter.

1.5 5-årsoverlevelse for udvalgte kræftformer

Blandt kvinder er 5-årsoverlevelsen for spiserørskræft steget med 6 procentpoint – fra 20 pct. i 2019-2021 til 26 pct. i 2022-2024 – mens der blandt mænd ses et fald på 3 procentpoint (jf. tabel 2). For hoved-halskræft og lungekræft er 5-årsoverlevelsen blandt kvinder øget med 5 procentpoint mellem de to seneste perioder. I samme periode er 5-årsoverlevelsen steget med 2-4 procentpoint for mavesæks-, lever-, livmoder-, nyre-, hjerne- og blodkræft. Omvendt er 5-årsoverlevelsen faldet med 1-2 procentpoint for bugspytkirtel-, livmoderhals-, blære- og lymfekræft. For de øvrige kræftformer er overlevelsen uændret eller steget med 1 procentpoint.

Blandt mænd er 5-årsoverlevelsen for bugspytkirtelkræft steget med 5 procentpoint fra 12 pct. i 2019-2021 til 17 pct. i 2022-2024, mens der ses et fald hos kvinder. Overlevelsen blandt mænd er desuden steget med 2-4 procentpoint i samme periode for hoved-hals-, mavesæk-, lever- og nyrekræft. Der ses et mindre fald på 1-2 procentpoint i 5-årsoverlevelsen blandt mænd med hud-, blære-, skjoldbruskkirtel-, lymfe- og tyk- og endetarmskræft. For de øvrige kræftformer er overlevelsen uændret eller steget med 1 procentpoint.

Tabel 2 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 21 udvalgte kræftformer, 2019-2021 til 2022-2024

	Kvinder		Mænd	
	2019-2021	2022-2024	2019-2021	2022-2024
Hoved-halskræft	68 (64-71)	73 (69-76)	64 (61-67)	66 (63-68)
Spiserørskræft	20 (15-26)	26 (20-32)	21 (18-24)	18 (15-21)
Mavesækskræft	37 (32-41)	41 (37-46)	31 (28-34)	34 (31-37)
Tyk- og endetarmskræft	73 (72-74)	74 (73-76)	72 (71-74)	71 (70-73)
Leverkræft	17 (13-21)	19 (15-23)	15 (13-18)	19 (16-22)
Bugspytkirtelkræft	16 (13-18)	14 (12-16)	12 (10-14)	17 (15-19)
Lungekræft (inkl. luftrør)	33 (31-34)	38 (36-39)	26 (24-27)	27 (26-29)
Modermærkekræft (malignt melanom)	98 (97-99)	98 (97-99)	96 (94-97)	96 (95-97)
Hudkræft (ekskl. modermærkekræft)	97 (96-98)	98 (97-99)	94 (93-96)	93 (92-94)
Brystkræft	91 (90-92)	91 (90-92)		
Livmoderhalskræft	77 (74-80)	75 (72-79)		
Livmoderkræft	82 (79-84)	85 (83-87)		
Æggestokkræft	47 (44-49)	48 (45-50)		
Prostatakræft			90 (89-91)	90 (89-91)
Testikelkræft			95 (89-98)	-
Nyrekræft	78 (75-81)	81 (77-84)	79 (76-82)	82 (79-84)
Blærekræft	78 (75-80)	77 (74-79)	83 (82-85)	81 (80-83)
Hjernetumorer	63 (61-66)	66 (64-68)	57 (55-60)	57 (54-59)
Skjoldbruskkirtelkræft	91 (88-94)	92 (89-94)	92 (86-95)	91 (86-94)
Lymfekræft	82 (80-84)	81 (80-83)	78 (76-80)	77 (75-78)
Blodkræft	77 (75-79)	80 (78-82)	72 (70-73)	72 (71-74)

Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 30 patienter i live ved periodestart og minimum 3 patienter i aldersgrupperne anvendt ved vægtning. For sjældne kræftformer eller kræftformer med få eller ingen dødsfald, kan kræftoverlevelsen ikke rapporteres, eksempelvis på grund af ustabile estimater og atypiske konfidensintervaller. Disse fremgår som "-"

3-års perioderne refererer til diagnoseår. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes.

Fra og med nærværende rapport - 'Kræftoverlevelse i Danmark 2010-2024' - er udvalgte grupper af kræftsygdomme udvidet til at inkludere 21 kræftformer i stedet for de hidtidige 15. Derudover er ICD-10 diagnoserne D459, D471, D473, D475 flyttet fra gruppen lymfekræft til blodkræft. Som følge af ændringerne er de udvalgte kræftformer i nærværende rapport ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende opgørelser i tidligere rapporter.

Publikation:	Publikationen "Kræftoverlevelse i Danmark" fra Sundhedsdatastyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, regioner, kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.
Mere information:	Se mere detaljerede tal samt metodebeskrivelse på sundhedsdatabank.dk - Sundhedsdatastyrelsens indgang til offentliggørelse af sundhedsdata [https://sundhedsdatabank.dk/sygdomme/kraeft]
Kilde og beregninger:	Alle beregninger er foretaget af Kræftens Bekæmpelse for Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af Cancerregisteret og CPR.
Kontaktperson:	Signe Klausen, tlf. 3063 5861, smsh@sundhedsdata.dk

Bilagstabeller

Bilagstabel 1 ICD10 kategorisering for udvalgte grupper

Anvendt klassifikation	ICD-10
Hoved-halskræft	C00-C14, C30-C32
Spiserørskræft	C15
Mavesækskræft	C16
Tyk- og endetarmskræft	C18-C20
Leverkræft	C22
Bugspytkirtelkræft	C25
Lungekræft (inkl. luftrør)	C33-C34
Modermærkekræft (malignt melanom)	C43
Hudkræft (ekskl. modermærkekræft)	C44 Ekskl. basalcelle hudkræft; ICD-O-3 morfologi 809X
Brystkræft	C50
Livmoderhalskræft	C53
Livmoderkræft	C54-C55
Æggestokkræft	C56, C570-C574
Prostatakræft	C61
Testikelkræft	C62
Nyrekræft	C64
Blærekræft	C67, D090, D095, D303, D414 Yderligere er D-koderne afgrænset ved ICD-O-3 morfologi 8120-813X
Hjernetumorer	C71, C751-C753, D330-D332, D352-D354, D430-D432, D443-D445

Anvendt klassifikation	ICD-10
Skjoldbruskkirtelkræft	C73
Lymfekræft	C81-C90
Blodkræft	C91-C96, D459, D46, D471, D473, D474, D475
Alle kræftformer undtagen ikke-modermærke hudkræft, brystkræft og prostatakkræft	C00-C96 (excl C44, C50, C61), D32, D330-D332, D334, D337, D339, D352-D354, D42-D43, D443-D445, D459, D46, D471, D473-D475, D090-D091*, D095-D096*, D301-D304*, D307*, D309*, D411-D414*, D417*, D419*
Alle kræftformer undtagen ikke-modermærke hudkræft	C00-C96 (excl C44), D32, D330-D332, D334, D337, D339, D352-D354, D42-D43, D443-D445, D459, D46, D471, D473-D475, D090-D091*, D095-D096*, D301-D304*, D307*, D309*, D411-D414*, D417*, D419*

Note: *D-koderne afgrænset ved ICD-O-3 morfologi 8120-813X

Fra og med nærværende rapport - 'Kræftoverlevelse i Danmark 2010-2024' - er udvalgte grupper af kræftsygdomme udvidet til at inkludere 21 kræftformer i stedet for de hidtidige 15. Derudover er ICD-10 diagnoserne D459, D471, D473, D475 flyttet fra gruppen lymfekræft til blodkræft. Som følge af ændringerne er de udvalgte kræftformer i nærværende rapport ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende opgørelser i tidligere rapporter.

Bilagstabel 2 1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 21 udvalgte kræftformer og alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modernærkekræft), samt for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modernærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd), 2010-2012 til 2022-2024

	Kvinder					Mænd				
	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024
Hoved-halskræft	81 (78-84)	85 (83-87)	84 (82-86)	86 (84-88)	87 (85-89)	80 (78-82)	82 (80-84)	83 (81-84)	85 (83-86)	85 (84-87)
Spiserørskræft	40 (35-45)	46 (39-51)	50 (44-56)	54 (50-58)	46 (39-53)	39 (36-42)	47 (44-51)	47 (44-50)	49 (45-52)	47 (43-50)
Mavesækskræft	50 (46-54)	56 (51-60)	61 (57-65)	62 (58-66)	64 (60-67)	48 (45-52)	58 (55-61)	56 (53-59)	61 (58-63)	61 (58-63)
Tyk- og endetarmskræft	81 (80-82)	87 (86-88)	87 (86-88)	88 (87-88)	88 (87-89)	81 (80-82)	86 (85-87)	88 (87-88)	88 (87-88)	87 (87-88)
Leverkræft	36 (31-41)	39 (34-45)	42 (37-47)	40 (35-45)	44 (39-48)	28 (25-32)	35 (31-38)	42 (38-45)	44 (41-48)	48 (45-52)
Bugspytkirtelkræft	27 (25-30)	34 (31-36)	38 (36-41)	40 (38-43)	40 (38-43)	22 (20-24)	29 (27-32)	34 (32-37)	39 (36-41)	39 (37-41)
Lungekræft (inkl. luftrør)	45 (43-46)	51 (50-53)	59 (57-60)	61 (60-62)	64 (63-65)	37 (36-39)	43 (41-44)	50 (48-51)	53 (52-55)	55 (53-56)
Modermærkekræft (malignt melanom)	98 (98-99)	99 (98-99)	99 (99-100)	99 (99-100)	99 (99-100)	97 (96-98)	98 (97-99)	99 (98-99)	98 (98-99)	99 (98-99)
Hudkræft (ekskl. modermærkekræft)	98 (97-99)	99 (98-99)	99 (98-99)	99 (99-100)	100 (99-100)	96 (95-97)	97 (96-98)	98 (97-99)	98 (98-99)	98 (98-99)
Brystkræft	97 (96-97)	97 (97-98)	97 (97-98)	97 (97-98)	98 (97-98)					
Livmoderhalskræft	89 (86-91)	87 (85-89)	91 (89-93)	89 (87-92)	90 (87-92)					
Livmoderkræft	94 (92-95)	94 (93-95)	94 (92-95)	93 (92-94)	93 (92-94)					
Æggestokkræft	76 (74-78)	80 (78-82)	82 (80-84)	81 (79-83)	83 (81-85)					
Prostatakræft						98 (98-99)	98 (97-98)	99 (98-99)	99 (98-99)	99 (98-99)
Testikelkræft						98 (94-99)	98 (93-100)	97 (93-98)	99 (95-100)	-
Nyrekræft	78 (75-81)	85 (83-88)	88 (86-90)	91 (88-92)	93 (91-95)	80 (78-82)	84 (82-86)	87 (85-89)	91 (89-92)	93 (92-94)
Blærekræft	85 (83-87)	86 (84-88)	87 (85-89)	89 (87-90)	88 (86-90)	89 (88-90)	92 (91-92)	92 (91-92)	93 (92-94)	92 (91-93)
Hjernetumorer	73 (71-75)	75 (73-77)	77 (75-79)	79 (77-81)	80 (79-82)	72 (70-74)	75 (73-77)	76 (74-78)	76 (74-78)	79 (77-80)
Skjoldbruskkirtelkræft	90 (87-93)	94 (91-95)	95 (93-97)	95 (94-97)	96 (94-97)	91 (83-95)	94 (90-97)	95 (91-97)	96 (94-98)	95 (92-96)
Lymfekræft	85 (83-87)	89 (88-90)	91 (89-92)	91 (90-92)	92 (91-93)	83 (81-84)	86 (85-88)	89 (88-90)	90 (89-91)	91 (90-92)

	Kvinder					Mænd				
	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024
Blodkræft	87 (86-89)	89 (88-90)	90 (89-91)	90 (88-91)	90 (89-91)	84 (82-85)	87 (85-88)	88 (86-89)	89 (87-90)	89 (88-90)
Alle kræftformer¹⁾	78 (78-79)	82 (81-82)	84 (83-84)	85 (84-85)	86 (85-86)	77 (76-77)	80 (80-81)	82 (82-83)	84 (83-84)	84 (84-85)
Alle kræftformer²⁾	72 (71-72)	76 (76-77)	79 (79-79)	80 (80-81)	81 (81-82)	69 (69-70)	74 (74-75)	77 (77-77)	79 (78-79)	80 (79-80)

Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne referer til diagnoseår. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes.

1) Alle kræftformer ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft

2) Alle kræftformer ekskl. prostatakræft og brystkræft, samt anden hudkræft end modermærkekræft.

*Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 30 patienter i live ved periodestart og minimum 3 patienter i aldersgrupperne anvendt ved vægtning. For sjældne kræftformer eller kræftformer med få eller ingen dødsfald, kan kræftoverlevelsen ikke rapporteres, eksempelvis på grund af ustabile estimater og atypiske konfidensintervaller. Disse fremgår som "-"

Fra og med nærværende rapport - 'Kræftoverlevelse i Danmark 2010-2024' - er udvalgte grupper af kræftsygdomme udvidet til at inkludere 21 kræftformer i stedet for de hidtidige 15. Derudover er ICD-10 diagnoserne D459, D471, D473, D475 flyttet fra gruppen lymfekræft til blodkræft. Som følge af ændringerne er de udvalgte kræftformer i nærværende rapport ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende opgørelser i tidligere rapporter.

Bilagstabel 3 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 21 udvalgte kræftformer og alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modernærkekræft), samt for alle kræftformer (eksklusiv anden hudkræft end modernærkekræft samt brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd), 2010-2012 til 2022-2024

	Kvinder					Mænd				
	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024
Hoved-halskræft	61 (57-65)	65 (61-69)	67 (64-71)	68 (64-71)	73 (69-76)	59 (56-62)	61 (58-64)	63 (60-66)	64 (61-67)	66 (63-68)
Spiserørskræft	16 (13-20)	17 (12-22)	19 (15-24)	20 (15-26)	26 (20-32)	12 (10-14)	19 (16-22)	20 (17-23)	21 (18-24)	18 (15-21)
Mavesækskræft	23 (19-27)	29 (25-33)	38 (33-42)	37 (32-41)	41 (37-46)	23 (20-25)	28 (25-31)	27 (24-30)	31 (28-34)	34 (31-37)
Tyk- og endetarmskræft	64 (62-65)	72 (71-73)	73 (72-74)	73 (72-74)	74 (73-76)	63 (61-64)	71 (69-72)	72 (71-73)	72 (71-74)	71 (70-73)
Leverkræft	12 (8-16)	14 (10-18)	19 (15-23)	17 (13-21)	19 (15-23)	8 (6-11)	11 (9-14)	16 (13-20)	15 (13-18)	19 (16-22)
Bugspytkirtelkræft	8 (6-10)	10 (8-12)	14 (11-16)	16 (13-18)	14 (12-16)	6 (5-8)	9 (7-10)	11 (9-13)	12 (10-14)	17 (15-19)
Lungekræft (inkl. luftrør)	19 (18-20)	23 (22-25)	31 (29-32)	33 (31-34)	38 (36-39)	13 (12-14)	18 (16-19)	23 (22-24)	26 (24-27)	27 (26-29)
Modermærkekræft (malignt melanom)	94 (93-95)	97 (95-98)	98 (97-99)	98 (97-99)	98 (97-99)	91 (89-92)	94 (92-95)	95 (94-96)	96 (94-97)	96 (95-97)
Hudkræft (ekskl. modermærkekræft)	94 (92-96)	96 (94-97)	96 (94-97)	97 (96-98)	98 (97-99)	90 (88-92)	91 (89-92)	93 (92-94)	94 (93-96)	93 (92-94)
Brystkræft	88 (87-89)	89 (88-90)	90 (89-91)	91 (90-92)	91 (90-92)					
Livmoderhalskræft	71 (67-74)	71 (68-74)	79 (76-82)	77 (74-80)	75 (72-79)					
Livmoderkræft	82 (80-84)	85 (83-87)	83 (81-85)	82 (79-84)	85 (83-87)					
Æggestokkræft	40 (38-43)	44 (42-47)	46 (43-48)	47 (44-49)	48 (45-50)					
Prostatakræft						88 (87-89)	90 (89-91)	90 (88-91)	90 (89-91)	90 (89-91)
Testikelkræft						98 (83-100)	98 (87-100)	94 (88-97)	95 (89-98)	-
Nyrekræft	62 (58-66)	70 (67-74)	77 (73-80)	78 (75-81)	81 (77-84)	64 (61-67)	70 (67-73)	76 (73-79)	79 (76-82)	82 (79-84)
Blærekræft	72 (69-75)	74 (71-76)	76 (73-78)	78 (75-80)	77 (74-79)	76 (75-78)	81 (79-82)	82 (80-83)	83 (82-85)	81 (80-83)
Hjernetumorer	54 (51-57)	55 (53-58)	61 (58-63)	63 (61-66)	66 (64-68)	48 (45-50)	50 (48-53)	55 (53-58)	57 (55-60)	57 (54-59)
Skjoldbruskkirtelkræft	87 (83-90)	91 (87-93)	90 (87-93)	91 (88-94)	92 (89-94)	85 (75-91)	87 (81-91)	89 (84-93)	92 (86-95)	91 (86-94)
Lymfekræft	73 (71-76)	78 (76-80)	81 (79-83)	82 (80-84)	81 (80-83)	69 (66-71)	72 (70-73)	78 (76-79)	78 (76-80)	77 (75-78)

	Kvinder					Mænd				
	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021	2022-2024
Blodkræft	73 (70-75)	76 (74-78)	77 (75-79)	77 (75-79)	80 (78-82)	65 (63-67)	70 (68-72)	72 (70-74)	72 (70-73)	72 (71-74)
Alle kræftformer1)	64 (64-65)	68 (68-69)	71 (70-71)	72 (71-72)	74 (73-74)	61 (61-62)	66 (65-66)	68 (68-69)	70 (69-70)	71 (70-71)
Alle kræftformer2)	55 (54-55)	60 (59-61)	64 (63-64)	65 (64-65)	67 (66-67)	52 (51-52)	57 (57-58)	61 (60-62)	63 (62-63)	64 (63-64)

Kilde: Cancerregisteret pr. 30. april 2025, Sundhedsdatastyrelsen.
Det Centrale Personregister (CPR) pr. 31. december 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 3-års perioderne referer til diagnoseår. 95 pct. konfidensinterval er angivet i parentes.

1) Alle kræftformer ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft

2) Alle kræftformer ekskl. prostatakræft og brystkræft, samt anden hudkræft end modermærkekræft.

*Kræftoverlevelsen rapporteres ikke for grupper med færre end 30 patienter i live ved periodestart og minimum 3 patienter i aldersgrupperne anvendt ved vægtning. For sjældne kræftformer eller kræftformer med få eller ingen dødsfald, kan kræftoverlevelsen ikke rapporteres, eksempelvis på grund af ustabile estimater og atypiske konfidensintervaller. Disse fremgår som "-"

Fra og med nærværende rapport - 'Kræftoverlevelse i Danmark 2010-2024' - er udvalgte grupper af kræftsygdomme udvidet til at inkludere 21 kræftformer i stedet for de hidtidige 15. Derudover er ICD-10 diagnoserne D459, D471, D473, D475 flyttet fra gruppen lymfekræft til blodkræft. Som følge af ændringerne er de udvalgte kræftformer i nærværende rapport ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende opgørelser i tidligere rapporter.